

## OZNAČENÍ NA OBALU

### ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

#### KRABÍČKA

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Mometason furoát Cipla 50 mikrogramů/dávku nosní sprej, suspenze

Mometasoni furoas monohydricus

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna odměřená dávka se rovná 50 mikrogramům mometasoni furoas (ve formě monohydrátu).

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: glycerol, disperzní celuloza RC 591 (směs mikrokrytalické celulosy a sodné soli karmelosy), monohydrát kyseliny citronové, polysorbát 80, benzalkonium-chlorid, dihydrát natrium-citrátu, voda na injekci.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Nosní sprej, suspenze.

140 odměřených dávek

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Používejte pouze tak, jak vám doporučil váš lékař.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Před použitím jemně protřepat.

Nosní podání

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

#### 8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

Spotřebujte do 2 měsíců od prvního otevření.

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte v původním obalu. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Cipla Europe NV, De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018 Antwerpen, Belgie

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg.č.: 69/092/13-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. š.:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Mometasone 50 mikrogramů nosní sprej

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

<2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.>

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

PC:

SN:

NN:

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU**

**ŠTÍTEK**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Mometason furoát Cipla 50 mikrogramů/dávku nosní sprej, suspenze

Mometasoni furoas monohydricus

Nosní podání

**2. ZPŮSOB PODÁNÍ**

Používejte pouze tak, jak vám doporučil váš lékař.

Před použitím jemně protřepat.

**3. POUŽITELNOST**

Použitelné do:

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. š.:

**5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET**

140 odměřených dávek

**6. JINÉ**

Uchovávejte v původním obalu. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Spotřebujte do 2 měsíců od prvního otevření.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

Reg.č.: 69/092/13-C

Cipla Europe NV, De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018 Antwerpen, Belgie