

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nicorette invisipatch 10 mg/16 h transdermální náplast  
nicotinum

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

nicotinum 1,75 mg/cm<sup>2</sup>  
Jedna transdermální náplast obsahuje nicotinum 15,75 mg

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Nikotinová vrstva: polyetylentereftalátový (PET) film, triacylglyceroly se středně dlouhým řetězcem, základní butylovaný metakrylátový kopolymer  
Akrylátová vrstva: adhezivní akrylátový roztok, hydroxid draselný, sodná sůl kroskarmelózy, aluminium-acetylacetonát.  
Uvolňovací vložka: polyetylentereftalátový (PET) film, z jedné strany potažený hliníkem, z obou stran potažený silikonem.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Transdermální náplast

7 náplastí

14 náplastí

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Transdermální podání.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

### 8. POUŽITELNOST

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Držitel rozhodnutí o registraci:  
McNeil AB  
251 09 Helsingborg, Švédsko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. číslo: 87/327/08-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

K léčbě závislosti na tabáku u dospělých.

Používejte jednu náplast denně. Náplast nalepte ráno ihned po probuzení a odstraňte ji večer před spaním, aby se zajistil 16hodinový účinek.  
Podrobné pokyny pro dávkování si pozorně přečtěte v příložené příbalové informaci.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

nicorette invisipatch 10 mg/16 h

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU**

Sáček

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Nicorette invisipatch 10 mg/16 h transdermální náplast  
nicotinum

**2. ZPŮSOB PODÁNÍ**

Transdermální podání.

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET**

Jedna transdermální náplast obsahuje nicotinum 15,75 mg.

**6. JINÉ**

McNeil AB