

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU –  
KRABÍČKA A TUBA 30 g nebo 100 g**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Bepanthen Plus 50 mg/g + 5 mg/g krém  
dexpanthenolum /chlorhexidini dihydrochloridum

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jeden g krému obsahuje dexpanthenolum 50 mg a chlorhexidini dihydrochloridum 5 mg.

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Racemický pantolakton, cetylalkohol, stearylalkohol, bílá vazelína, tekutý parafín, tuk z ovčí vlny, makrogol-2000- stearát, čištěná voda.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Krém  
30 g, 100 g

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Kožní podání  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN  
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**

Použitelné do:

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ**

**NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. Pouze na krabičce

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

BAYER s.r.o., Praha, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

46/546/93-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

č.š.:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. Pouze na krabičce

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Na očištěnou ránu naneste tenkou vrstvu přípravku Bepanthen Plus, podle potřeby překryjte náplastí nebo obvazem. Nanášejte i několikrát (1-5x) denně až do zahojení rány.

Krém na drobná povrchová poranění s rizikem infekce.

Antiseptický hojivý krém

K dezinfekci a hojení drobných poranění.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Bepanthen Plus Pouze na krabičce

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVADĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU**

**TUBA 3,5 g**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Bepanthen Plus 50 mg/g + 5 mg/g krém  
dexpanthenolum /chlorhexidini dihydrochloridum

**2. ZPŮSOB PODÁNÍ**

Kožní podání  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**3. POUŽITELNOST**

Použitelné do:

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

č.š.:

**5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET**

Krém  
3,5 g

**6. JINÉ**

Antiseptický hojivý krém. K dezinfekci a hojení drobných poranění.

Logo Bayer