

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Jodisol spray 3,85 g/100 g kožní sprej, roztok

povidonum iodinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

100 g roztoku obsahuje povidonum iodinum 3,85 g.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje ethanol 96%.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Kožní sprej, roztok

7 g

13 g

35 g

75 g

5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Kožní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Vysoce hořlavý

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

SpofaDental a.s., Markova 238, 506 01 Jičín, Česká republika

12. REGISTRACNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 32/218/98-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Ošetření drobných povrchových ran při první pomoci.
Dezinfekce povrchu pokožky a sliznice.
Působí během 1 minuty.

Přípravek je určen k lokálnímu použití a nanáší se přímo na ošetřované místo. Postříkem pokryjte celý předem očištěný povrch ošetřovaného místa.

Jodisol spray se obvykle aplikuje jednou až třikrát denně.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

jodisol spray

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Lahvička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Jodisol spray 3,85 g/100 g kožní sprej, roztok

povidonum iodinatum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

100 g roztoku obsahuje povidonum iodinatum 3,85 g.

3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK

Obsahuje ethanol 96%.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Kožní sprej, roztok

35 g

75 g

5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Kožní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Vysoce hořlavý

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

SpofaDental a.s., Markova 238, 506 01 Jičín, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 32/218/98-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Ošetření drobných povrchových ran, dezinfekce povrchu pokožky a sliznice.
Jodisol spray se na ošetřované místo obvykle aplikuje jednou až třikrát denně.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Lahvička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Jodisol spray 3,85 g/100 g kožní sprej, roztok

povidonum iodinatum

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Kožní podání

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Kožní sprej, roztok

7 g

13 g

6. JINÉ