

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNEJŠÍM OBALU A VNITŘÍM OBALU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gaviscon Duo Efekt 250 mg/106,5 mg/187,5 mg žvýkácí tablety
natrii alginas/natrii hydrogenocarbonas/calcii carbonas

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna žvýkácí tableta obsahuje natrii alginas 250 mg; natrii hydrogenocarbonas 106,5 mg a calcii carbonas 187,5 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje aspartam (E 951). Pokud máte fenylketonurii, je třeba vědět, že tento přípravek obsahuje sladidlo aspartam (E 951), což je zdroj fenylalaninu.
Obsahuje azorubin (E 122).

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

4 žvýkácí tablety
6 žvýkácích tablet
8 žvýkácích tablet
16 žvýkácích tablet
24 žvýkácích tablet
32 žvýkácích tablet
48 žvýkácích tablet
60 žvýkácích tablet
62 žvýkácích tablet
64 žvýkácích tablet
80 žvýkácích tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Tabletu před spolknutím řádně rozžvýkejte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pokud příznaky trvají déle než 7 dnů, poraďte se s lékařem.

Obsahuje sodík a vápník. Pokud Vám bylo doporučeno, abyste dodržoval(a) dietu s omezením solí sodíku a vápníku, poraďte se, prosím, se svým lékařem, dříve než začnete užívat tento přípravek. Přípravek s vysokým obsahem sodíku - další informace viz příbalová informace.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C (25 °C pro PP obal na tablety).

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. (vnější obal)

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č. ČR: 09/1053/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Dospělí a děti věku 12 let a starší: Při objevení příznaků užíjte dvě až čtyři tablety po jídle nebo večer před spaním, maximálně čtyřikrát denně.

Děti mladší než 12 let: Používejte pouze na doporučení lékaře.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

gaviscon duo efekt žvýkácí tablety

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gaviscon Duo Efekt 250 mg/106,5 mg/187,5 mg žvýkáací tablety

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

3. POUŽITELNOST

MM/RRRR

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ