

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

STREPFEN 8,75 mg pastilky

flurbiprofenum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna pastilka obsahuje flurbiprofenum 8,75 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dále obsahuje makrogol 300, hydroxid draselný, citronové aroma, levomenthol, tekutá glukosa, prostý sirup (obsahuje sacharózu), čištěný med

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

16, 24 pastilek

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Upozornění:

Text na blistru je v cizím jazyce.

Na vnitřním blistru je uveden název Strepsils 8,75 mg Lutschtabletten. Tento název je uveden na blistru pod etiketou. Pod tímto názvem je tento léčivý přípravek registrován v členské zemi EHP, ze které je dovážen.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**Držitel rozhodnutí o registraci referenčního přípravku v ČR:**

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

Souběžný dovozce:

Pharmedex s.r.o, Lisabonská 799/8, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

69/161/02-C/PI/025/19

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Pastilky **Streptfen** zmírňují bolest a otok v krku, které doprovázejí zánětlivá a infekční onemocnění dutiny ústní a hltanu bakteriálního nebo virového původu (např. při angině).

Dávkování:

Dospělí a dospívající starší 12 let: jedna pastilka se nechá rozpustit v ústech každých 3 - 6 hodin. Neužívejte více než 5 pastilek během 24 hodin. Při rozpouštění přemísťujte pastilku v ústech.

Streptfen není určený pro děti do 12 let.

Úleva od bolesti a otoku v krku

Protizánětlivý účinek

Působí až 6 hodin proti bolestivému otoku v krku

Med a Citron

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Streptfen 8,75 mg pastilky

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.