

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Strepsils Med a Citron 0,6 mg/1,2 mg pastilky
amylmetacresolum/alcohol dichlorobenzylicus

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Složení:

Jedna pastilka obsahuje amylmetacresolum 0,6 mg, alcohol 2,4-dichlorobenzylicus 1,2 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: kyselina vinná, čišťený med, silice máty peprné a citronová silice (obsahují citral, d-limonen, geraniol a linalol), chinolinová žluť, tekutá sacharosa, tekutá glukosa usušená rozprášením (z pšeničného škrobu).

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Pastilka

6, 8, 10, 12, 16, 24, 36 pastilek

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Orální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č. ČR: 69/372/92-S/C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Úleva od bolesti v krku

Působí proti bakteriím, virům a kvasinkám

Strepsils Med a Citron se používá k léčbě příznaků zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní, hltanu a k úlevě od bolesti v krku.

Pastilky Strepsils Med a Citron jsou určeny pro dospělé, dospívající a děti starší 6 let.

Dávkování:

Pastilku nechte volně rozpustit v ústech každé 2-3 hodiny.

Dospělí: používejte maximálně 12 pastilek v průběhu 24 hodin.

Dospívající a děti od 6 let: používejte maximálně 6 pastilek v průběhu 24 hodin.

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě. Přetrvávají-li u Vás příznaky onemocnění déle než 3 dny, vyhledejte lékaře.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

strepsils med a citron

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Strepsils Med a Citron 0,6 mg/1,2 mg pastilky
amylmetacresolum/alcohol dichlorobenzylicus

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č. ČR : 69/372/92-S/C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Úleva od bolesti v krku

Působí proti bakteriím, virům a kvasinkám

Strepsils Citron bez cukru se používá k léčbě příznaků zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní, hltanu a k úlevě od bolesti v krku.

Pro dospělé, dospívající a pro děti od 5 let.

Dávkování:

Dospělí a dospívající od 15 let: Používejte maximálně 6 pastilek v průběhu 24 hodin.

Děti od 8 do 15 let: 4x denně 1 pastilka.

Děti od 5 do 7 let: 3x denně 1 pastilka.

Pastilku nechte volně rozplynout v ústech každé 2-3 hodiny.
Pastilky se nemají používat těsně před jídlem nebo během jídla.

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě. Přetrvávají-li u Vás příznaky onemocnění déle než 3 dny, vyhledejte lékaře.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

strepsils med a citron

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--

Neuplatňuje se.