

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### KRABIČKA

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

**Hirudoid forte** 445 mg/100 g gel  
glycosaminoglycani polysulfas

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

100 g gelu obsahuje glycosaminoglycani polysulfas 445 mg, ekvivalentní 40 000 U.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: hydroxid sodný, karbomer 980, isopropylalkohol, propylenglykol, čištěná voda.  
Další informace viz příbalová informace.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

gel  
40 g  
100 g

#### 5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

##### **Kožní podání**

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

#### 8. POUŽITELNOST

EXP  
Po prvním otevření: 1 rok

#### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

#### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

#### 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel  
Německo

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č.: 85/551/92-S/C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

**K místní léčbě poranění tupým předmětem s krevním výronem nebo bez výronu**

Přípravek se používá k místní léčbě poranění způsobených tupým předmětem s krevním výronem nebo bez výronu.

Gel se nanáší 2–3krát denně na postižené místo a jemně se vetře do pokožky. Podle velikosti ošetřovaného místa obvykle stačí nanést proužek krému v délce asi 3 – 5 cm.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

hirudoid forte

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**

**TUBA**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

**Hirudoid forte** 445 mg/100 g gel  
glycosaminoglycani polysulfas

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

100 g gelu obsahuje glycosaminoglycani polysulfas 445 mg, ekvivalentní 40 000 U.

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Hydroxid sodný, karbomer 980, isopropylalkohol, propylenglykol, čištěná voda.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

gel  
40 g  
100 g

**5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ**

**Kožní podání**

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**

EXP  
Po prvním otevření: 1 rok

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

STADA Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel  
Německo

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č.: 85/551/92-S/C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Přípravek se používá k místní léčbě poranění způsobených tupým předmětem s krevním výronem nebo bez výronu.

Gel se nanáší 2–3krát denně na postižené místo a jemně se vetře do pokožky. Podle velikosti ošetřovaného místa obvykle stačí nanést proužek krému v délce asi 3 – 5 cm.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**