

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Duac 10 mg/g + 50 mg/g gel
clindamycinum/benzoylis peroxidum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Léčivé látky:
clindamycinum 1 % w/w (10 mg/g) jako clindamycini dihydrogenophosphas, benzoylis peroxidum
5 % w/w (50 mg/g) jako benzoylis peroxidum cum aqua.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: karbomer, dimetikon, dinatrium-lauryl-sulfosukcinát, dihydrát dinatrium-edetátu, glycerol, koloidní hydratovaný oxid křemičitý, poloxamer 182, čištěná voda, hydroxid sodný.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

gel

5 g
6 g
15 g
25 g
30 g
50 g
55 g
60 g
70 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Pouze ke kožnímu podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Upozornění:

Zabraňte kontaktu s očima, se rty, ústy nebo nosní sliznicí a poškozenou pokožkou.

Na citlivá místa pokožky aplikujte opatrně.

Může odbarvovat vlasy nebo barvený textil.

Nepoužívejte při přecitlivělosti na linkomycin nebo další složky přípravku.

Může trvat 2 – 5 týdnů než začnete pozorovat léčebný účinek přípravku.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Pokyny pro lékárníky: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem.

Pokyny pro pacienty: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Po 2 měsících zlikvidujte.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GlaxoSmithKline, s.r.o.

Hvězdova 1734/2c

Praha 4

Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

46/121/05-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ**Návod k použití:**

Používejte dle doporučení lékaře.

Nanášejte konečky prstů jednou denně večer na postižená místa, která je před aplikací gelu potřeba důkladně umýt, opláchnout teplou vodou a osušit. Viz příbalová informace.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

duac

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

TUBA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Duac 10 mg/g + 50 mg/g gel
clindamycinum/benzoylis peroxidum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Léčivé látky:
clindamycinum 1 % w/w (10 mg/g), benzoylis peroxidum 5 % w/w (50 mg/g).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky, upozornění a návod k použití: viz příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

gel

5 g

6 g

15 g

25 g

30 g

50 g

55 g

60 g

70 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Lékárníci: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem.

Pacienti: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Po 2 měsících zlikvidujte.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

GlaxoSmithKline, s.r.o.

Praha, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

46/121/05-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**15. NÁVOD K POUŽITÍ****16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU****17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD****18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**