

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

**Nurofen pro děti pomeranč 40 mg/ml** perorální suspenze  
ibuprofenum

pro děti od 20 kg tělesné hmotnosti (6 let věku) do 40 kg tělesné hmotnosti (12 let věku)  
pomerančová příchut'

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml perorální suspenze obsahuje ibuprofenum 40 mg.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje roztok maltitolu, sodík a pšeničný škrob.

Podrobnější informace viz příbalová informace.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Perorální suspenze

1 x 30 ml lahvička  
1 x 50 ml lahvička  
1 x 100 ml lahvička  
1 x 150 ml lahvička  
1 x 200 ml lahvička

Oboustranná odměrná lžička (se lžičkou o objemu 2,5 ml označenou vnitřní ryskou na 1,25 ml na jedné straně a se lžičkou o objemu 5 ml na straně druhé).

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

Nepřekračujte stanovené dávkování.

**8. POUŽITELNOST**

EXP

Doba použitelnosti po prvním otevření lahvičky: 6 měsíců.

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

**Držitel rozhodnutí o registraci:**

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č. ČR: 07/968/10-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

**Ke krátkodobé léčbě mírných až středně silných bolestí a horečky.**

**Vždy užívejte Nurofen pro děti pomeranč přesně podle následujících pokynů. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.**

**Obvyklé dávkování při bolesti a horečce:**

| <b>Tělesná hmotnost dítěte (věk)</b> | <b>Jednotlivá dávka</b>   | <b>Jak často během 24 hodin?*</b> |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 20–29 kg (6-9 let)                   | 5 ml (200 mg ibuprofenu)  | 3krát                             |
| 30–40 kg (10-12 let)                 | 7,5 ml (300 mg ibuprofenu)<br>(použijte lžičku dvakrát:<br>1 x 5 ml + 1 x 2,5 ml) | 3krát                             |

\*Jednotlivé dávky se mají podávat přibližně každých 6 až 8 hodin.

Pokud je nutné přípravek užívat déle než 3 dny, nebo pokud se příznaky zhorší, poraďte se s lékařem.

**Není určeno dětem mladším než 6 let nebo vážícím méně než 20 kg.**

**VAROVÁNÍ:** Nepřekračujte stanovené dávkování.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

nurofen pro děti pomeranč 40 mg/ml

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Lahvička

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

**Nurofen pro děti pomeranč 40 mg/ml** perorální suspenze  
ibuprofenum

pro děti od 20 kg tělesné hmotnosti (6 let věku) do 40 kg tělesné hmotnosti (12 let věku)

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml perorální suspenze obsahuje ibuprofenum 40 mg.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje roztok maltitolu, sodík a pšeničný škrob.

Podrobnější informace viz příbalová informace.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Perorální suspenze

1 x 30 ml lahvička  
1 x 50 ml lahvička  
1 x 100 ml lahvička  
1 x 150 ml lahvička  
1 x 200 ml lahvička

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nepřekračujte stanovené dávkování.

**8. POUŽITELNOST**

EXP

Doba použitelnosti po prvním otevření lahvičky: 6 měsíců.

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ****11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Praha 3, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č. ČR: 07/968/10-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ****Ke krátkodobé léčbě mírných až středně silných bolestí a horečky.****Vždy užívejte Nurofen pro děti pomeranč přesně podle následujících pokynů. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.****Obvyklé dávkování při bolesti a horečce:**

| <b>Tělesná hmotnost dítěte (Věk)</b> | <b>Jednotlivá dávka</b>   | <b>Jak často během 24 hodin?*</b> |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 20–29 kg (6-9 let)                   | 5 ml (200 mg ibuprofenu)  | 3krát                             |
| 30–40 kg (10-12 let)                 | 7,5 ml (300 mg ibuprofenu)<br>(použijte lžičku dvakrát:<br>1 x 5 ml + 1 x 2,5 ml) | 3krát                             |

\*Dávky se mají podávat přibližně každých 6 až 8 hodin.

**Není určeno dětem mladším než 6 let nebo vážícím méně než 20 kg.**

**VAROVÁNÍ:** Nepřekračujte stanovené dávkování.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**