

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Arnidol spray
30 mg/ml + 100 mg/ml
kožní sprej, roztok

hydroxyethylis salicylas, arnicae tinctura

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml roztoku obsahuje hydroxyethylis salicylas 30 mg a arnicae tincture 100 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Isopropyl-myristát, citronelová silice, kosodřevinová silice, levandulová silice, borovicová silice, blahovičnicková silice, kafr, ethanol 96 (V/V)

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Kožní sprej, roztok
50 ml
100 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH

Plinganserstr. 40

D-81369 Mnichov,
Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

45/617/00-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Arnidol spray nastříkejte 2 až 3 krátkými stisky rozprašovače na kůži postiženého místa těla, postřík po 10 až 15 minutách opakujte nebo na místo přiložte přípravkem postříkaný mulový obvaz. Tento postup je možné opakovat až 3krát denně.

Při postříku držte lahvičkus přípravkem ve svislé poloze. Bez porady s lékařem nepoužívejte déle než 14 dní.

Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 15 let.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

arnidol spray

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU,
Lahvička ETIKETA**

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Arnidol spray
30 mg/ml + 100 mg/ml
kožní sprej, roztok
hydroxyethylis salicylas, arnicae tinctura

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml roztoku obsahuje hydroxyethylis salicylas 30 mg a arnicae tincture 100 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Isopropyl-myristát, citronelová silice, kosodřevinová silice, levandulová silice, borovicová silice, blahovičnicková silice, kafr, ethanol 96 (V/V)

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Kožní sprej, roztok
50 ml
100 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání
Před použitím si přečtěte příbalovou informace.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT
UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH

Plinganserstr. 40

D-81369 Mnichov,
Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

45/617/00-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Arnidol spray nastříkejte 2 až 3 krátkými stisky rozprašovače na kůži postiženého místa těla a postřík po 10 až 15 minutách opakuje nebo na místo přiložte přípravek postříkaný mulový obvaz. Tento postup je možno opakovat až 3 krát denně. Při postříku držte lahvičku s přípravkem ve svislé poloze. Bez porady s lékařem nepoužívejte déle než 14 dní. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 15 let.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.