

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Canesten GYN 6 dní 10 mg/g vaginální krém
klotrimazol

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden gram vaginálního krému obsahuje 10 mg klotrimazolu.
Obsah 1 aplikátoru (asi 5 g) odpovídá 50 mg klotrimazolu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Benzylalkohol, cetyl-palmitát, cetylstearylalkohol, čištěná voda, polysorbát 60, sorbitan-stearát, octyldodekanol.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Vaginální krém
35 g vaginálního krému + 6 aplikátorů

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Vaginální podání.

Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BAYER s.r.o., Praha, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg.č. 54/605/00-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Canesten GYN 6 dní se používá k léčbě zánětů pochvy a zevního genitálu u žen (vulvitida) a k léčbě zánětu žaludu pohlavního údu (balanitida) u mužů.

ZPŮSOB POUŽITÍ U ZÁNĚTU POCHVY:

Obsah 1 aplikátoru vaginálního krému (asi 5 g) se zavádí každý večer 6 po sobě následujících dní.

ZPŮSOB POUŽITÍ U ZÁNĚTU ZEVNÍHO GENITÁLU U ŽEN A ZÁNĚTU ŽALUDU U MUŽŮ:

Vaginální krém se nanese v tenké vrstvě na postižené oblasti (zevní pohlavní orgány až ke konečníku u žen; žalud a předkožka u mužů) 2-3krát denně a vetře se.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Canesten GYN 6 dní

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**TUBA/krém****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Canesten GYN 6 dní 10 mg/g vaginální krém
klotrimazol

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden gram vaginálního krému obsahuje 10 mg klotrimazolu.
Obsah 1 aplikátoru (asi 5 g) odpovídá 50 mg klotrimazolu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Benzylalkohol, cetyl-palmitát, cetylstearylalkohol, čištěná voda, polysorbát 60, sorbitan-stearát, octyldodekanol

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Vaginální krém
35 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Vaginální podání.
Kožní podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**8. POUŽITELNOST**

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BAYER s.r.o., Praha, Česká republika

12. REGISTRACNÍ ČÍSLO(A)

Reg.č. 54/605/00-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Canesten GYN 6 dní se používá k léčbě zánětů pochvy a zevního genitálu u žen a k léčbě zánětu žaluďu pohlavního údu u mužů.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.