

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### KRABÍČKA

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DRILL RŮŽOVÝ MED 3 mg/0,2 mg pastilky  
chlorhexidini digluconas / tetracaini hydrochloridum

#### 2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna pastilka obsahuje:  
Chlorhexidini digluconas 3,0 mg  
Tetracaini hydrochloridum 0,2 mg

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: natrium-askorbát, sacharóza, glukóza, čišťený med, amonium-glycyrrhizát, suchý lékořicový extrakt, přírodní růžové aroma.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Pastilka  
12 pastilek, 24 pastilek

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Orální podání  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

#### 8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

#### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Pierre Fabre Medicament  
Les Cauquillous  
81500 - Lavaur, Francie

**12. REGISTRACNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Registrační číslo: 69/039/07-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Indikace: léčba lehkých bolestí v krku a v dutině ústní, při nachlazení a chřipce bez horečky a celkových příznaků. Dále se užívá při aftech, drobných poraněních v dutině ústní a moučnivce.

Dávkování:

**Dospělí a dospívající starší 15 let:** 1 pastilku nechat rozpustit v ústech podle potřeby, maximálně 4x za den, v intervalu nejméně 2 hodin.

**Děti od 6 do 15 let:** 1 pastilku nechat rozpustit v ústech podle potřeby, maximálně 2-3x za den v intervalu nejméně 4 hodin.

Pokud se do 5 dnů (děti do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Nepodávejte dětem do věku 6 let.

Bezprostředně po rozpuštění pastilky v ústech nejezte ani nepijte (nebezpečí zalknutí díky místnímu znečistlivění).

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

**DRILL RŮŽOVÝ MED**

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH**

**blistr**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

DRILL RŮŽOVÝ MED 3 mg/0,2 mg pastilky  
chlorhexidini digluconas / tetracaini hydrochloridum

**2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Pierre Fabre Medicament

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

LOT

**5. JINÉ**