

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU****KRABIČKA****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

COTYLENA 10 mg/g krém

clotrimazolum

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jeden g krému obsahuje clotrimazolum 10 mg.

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Pomocné látky: sorbitan-stearát, polysorbát 60, umělá vorvaňovina, cetylstearylalkohol, benzylalkohol, oktyldodekanol, čištěná voda

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

krém

20 g

50 g

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

kožní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ****8. POUŽITELNOST**

Použitelné do:

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ****10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

STADA Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2-18  
61118 Bad Vilbel  
Německo

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č.: 26/268/95-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. š.

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

K léčbě kožních plísňových onemocnění a zánětů způsobených kvasinkami, dermatofyty či některými bakteriemi a zánětů zevních rodidel a pohlavního údu.

Krém se používá při léčbě:

- kožních plísňových onemocnění (mykóz), kožních zánětů způsobených kvasinkami, dermatofyty či některými bakteriemi,
- kvasinkových a jiných zánětů zevních rodidel ženy a pohlavního údu mužů.

Krém se nanáší 2krát až 3krát denně v tenké vrstvě na omytá a osušená postižená místa. Proužek krému dlouhý 0,5 cm stačí k ošetření plochy o velikosti dlaně.

**Bez porady s lékařem nepoužívejte déle než 4 týdny.**

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

cotylena krém

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU****TUBA****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

COTYLENA 10 mg/g krém

clotrimazolum

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jeden g krému obsahuje clotrimazolum 10 mg.

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Pomocné látky: sorbitan-stearát, polysorbát 60, umělá vorvaňovina, cetylstearylalkohol, benzylalkohol, oktyldodekanol, čištěná voda

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

krém

20 g

50 g

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

kožní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ****8. POUŽITELNOST**

Použitelné do:

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ****10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

STADA Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2-18  
61118 Bad Vilbel  
Německo

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č.: 26/268/95-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. š.:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ****15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Krém se používá při léčbě:

- kožních plísňových onemocnění (mykóz), kožních zánětů způsobených kvasinkami, dermatofyty či některými bakteriemi,
- kvasinkových a jiných zánětů zevních rodidel ženy a pohlavního údu mužů.

Krém se nanáší 2krát až 3krát denně v tenké vrstvě na omytá a osušená postižená místa. Proužek krému dlouhý 0,5 cm stačí k ošetření plochy o velikosti dlaně.

**Bez porady s lékařem nepoužívejte déle než 4 týdny.**

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU****17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD****18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**