

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SARIDON 250 mg/150 mg/50 mg tablety
paracetamol/ propyfenazon /kofein

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 250 mg paracetamolu, 150 mg propyfenazonu, 50 mg kofeinu

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

10, 20 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním a/nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol.

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bayer s.r.o., Praha, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

07/250/98-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Pomáhá proti bolesti

Saridon je účinný na: bolest hlavy, zubů, menstruační bolesti a bolesti po operačních zákrocích a k mírnění bolesti a tlumění horečky při akutním zánětu horních cest dýchacích a chřipce.

Dávkování: dospělí: 1-2 tablety, dospívající (12-18 let) 1 tableta v jedné dávce
Zapijte dostatečným množstvím vody. Jednotlivá dávka může být opakována v intervalu 4-6 hodin. V případě potřeby lze podávat jednotlivou dávku až třikrát během 24 hodin.
Nepřekračujte doporučené dávkování!
Analgetika nemají být užívána pravidelně delší dobu bez doporučení lékaře.
Nepodávejte dětem do 12 let!

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Saridon

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SARIDON 250 mg/150 mg/50 mg tablety
paracetamol/ propyfenazon /kofein

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Logo firmy Bayer

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ