

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Mundisal 87,1 mg/g orální gel
cholin-salicylát

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden g gelu obsahuje 87,1 mg cholin-salicylátu.

3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK

Hypromelosa, glycerol, ethanol 96 % (v/v), anýzová silice, levomenthol, natrium-cyklamát, čištěná voda.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Orální gel
8 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Orální podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Neaplikujte do očí.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Po otevření tuby spotřebujte do 12 měsíců.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Mundipharma Gesellschaft m.b.H

Wiedner Gürtel 13
Turm 24, OG 15
1100 Vídeň
Rakousko

logo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

95/288/73-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

K použití při bolestech, zánětech, podráždění, poranění a vředech v dutině ústní, na sliznici nosu nebo hltanu.

Malé množství gelu naneste 3-4x denně na postižené místo a lehce vmasírujte.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

mundisal

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

TUBA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Mundisal 87,1 mg/g orální gel
cholin-salicylát

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Orální podání

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

8 g

6. JINÉ

Malé množství gelu naneste 3-4x denně na postižené místo a lehce vmasírujte.

K použití při bolestech, zánětech, podráždění, poranění a vředech v dutině ústní, na sliznici nosu nebo hltanu.

Neaplikujte do očí.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Mundipharma Gesellschaft m.b.H., Rakousko

logo