

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TANTOGRIP citrón 600 mg/10 mg prášek pro perorální roztok v sáčku
paracetamol/fenylefrin-hydrochlorid

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden sáček obsahuje: 600 mg paracetamolu, 10 mg fenylefrin-hydrochloridu (což odpovídá 8,2 mg fenylefrinu)

3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: sacharóza, sodík, glukóza.

Další údaje – viz příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro perorální roztok v sáčku

10 sáčků

16 sáčků

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Neužívejte s dalšími léky na nachlazení a chřipku a s léky uvolňujícími zduření nosní sliznice. OBSAHUJE PARACETAMOL. Nepřekračujte uvedené dávkování. Dávky vyšší než doporučené mohou způsobit závažné poškození jater.

Neužívejte žádné další přípravky obsahující paracetamol.

Neužívejte tento přípravek bez doporučení Vašeho lékaře, pokud máte onemocnění jater nebo problémy s konzumací alkoholu.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Neznečišťujte životní prostředí nepoužitými léčivy nebo jejich zbytky. Vyhod'te je do příslušných nádob určených k likvidaci léčiv.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Brno, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 07/721/15-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Indikace

Zmírnění příznaků nachlazení a chřipky, včetně úlevy od mírné až středně silné bolesti, bolesti v krku a bolesti hlavy, zduření nosní sliznice a horečky.

Použijte tento lék, pouze pokud jsou příznaky chřipky a nachlazení doprovázeny ucpaným nosem.

Dávkování

Dospělí a dospívající od 12 let a s hmotností nad 40 kg: 1 sáček podle potřeby až 4krát denně. Mezi jednotlivými dávkami dodržujte interval nejméně 4-6 hodin. Neužívejte více než 4 sáčky během 24 hodin.

Rozpus'te obsah sáčku ve sklenici (přibližně 150 ml) horké nebo studené vody a vypijte.

Neužívejte TANTOGRIP déle než 5 dní.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

tantogrip citrón

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Sáček

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

TANTOGRIP citrón 600 mg/10 mg prášek pro perorální roztok v sáčku
paracetamol/fenylefrin-hydrochlorid

Perorální podání

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Rozpusťte obsah sáčku ve sklenici (přibližně 150 ml) horké nebo studené vody a vypijte.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Jeden sáček (4,1 g) obsahuje léčivé látky: 600 mg paracetamolu, 10 mg fenylefrin-hydrochloridu.
Přípravek také obsahuje: sacharózu, sodík a glukózu (další údaje – viz příbalová informace).

6. JINÉ

Indikace: zmírnění příznaků nachlazení a chřipky, včetně úlevy od mírné až středně silné bolesti, bolesti v krku a bolesti hlavy, zduření nosní sliznice a horečky.

TANTOGRIP je určen k podávání dospělým a dospívajícím od 12 let a hmotností nad 40 kg.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.