

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Lahvička

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ibuprofen Dr.Max 400 mg potahované tablety

ibuprofenum

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje ibuprofenum 400 mg.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Potahovaná tableta

10 potahovaných tablet  
20 potahovaných tablet  
30 potahovaných tablet  
36 potahovaných tablet  
40 potahovaných tablet  
50 potahovaných tablet  
60 potahovaných tablet  
100 potahovaných tablet

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

### 8. POUŽITELNOST

EXP

### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

**Držitel rozhodnutí o registraci:**

Dr. Max Pharma s.r.o.  
Na Florenci 2116/15  
Nové Město  
110 00 Praha 1  
Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č.: 29/107/14-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Otevřete zde

Bolest hlavy  
Bolest zubů  
Bolest při poranění měkkých tkání  
Menstruační bolest  
Horečka

Pro dospělé a dospívající s tělesnou hmotností od 40 kg (od 12 let věku).

**K úlevě od:**

**Mírné až středně silné bolesti a horečky:** užijte ½ tablety až 1 tabletu; pokud je to nezbytné, opakujte podání každých 4-6 hodin.

**Migrenózní bolesti hlavy:** užijte 1 tabletu; pokud je to nezbytné, opakujte podání každých 4-6 hodin.

**Menstruační bolesti:** užijte ½ tablety až 1 tabletu 1 až 3krát denně podle potřeby v intervalu 4-6 hodin.

Neužívejte více než 3 tablety (1 200 mg) během 24 hodin.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

ibuprofen dr.max 400 mg

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ibuprofen Dr.Max 400 mg potahované tablety

ibuprofenum

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje ibuprofenum 400 mg.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Potahovaná tableta

6 potahovaných tablet  
10 potahovaných tablet  
12 potahovaných tablet  
20 potahovaných tablet  
24 potahovaných tablet  
30 potahovaných tablet  
36 potahovaných tablet  
40 potahovaných tablet  
48 potahovaných tablet  
50 potahovaných tablet  
60 potahovaných tablet  
100 potahovaných tablet

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.  
Perorální podání.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

**8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ****10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI****Držitel rozhodnutí o registraci:**

Dr. Max Pharma s.r.o.  
Na Florenci 2116/15  
Nové Město  
110 00 Praha 1  
Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č.: 29/107/14-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Bolest hlavy  
Bolest zubů  
Bolest při poranění měkkých tkání  
Menstruační bolest  
Horečka

Pro dospělé a dospívající s tělesnou hmotností od 40 kg (od 12 let věku).

**K úlevě od:**

**Mírné až středně silné bolesti a horečky:** užijte ½ tablety až 1 tabletu; pokud je to nezbytné, opakujte podání každých 4-6 hodin.

**Migrenózní bolesti hlavy:** užijte 1 tabletu; pokud je to nezbytné, opakujte podání každých 4-6 hodin.

**Menstruační bolesti:** užijte ½ tablety až 1 tabletu 1 až 3krát denně podle potřeby v intervalu 4-6 hodin.

Neužívejte více než 3 tablety (1 200 mg) během 24 hodin.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

ibuprofen dr.max 400 mg

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH**

**BLISTR**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Ibuprofen Dr.Max 400 mg potahované tablety

ibuprofenum

**2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Dr. Max Pharma s.r.o. (logo)

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**5. JINÉ**