

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNEJŠÍM OBALU A VNITŘÍM OBALU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gaviscon Duo Efekt 500 mg/213 mg/325 mg perorální suspenze
natrii alginas / natrii hydrogenocarbonas / calcii carbonas

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

10 ml suspenze obsahuje natrii alginas 500 mg; natrii hydrogenocarbonas 213 mg a calcii carbonas 325 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sodík, methylparaben (E 218) a propylparaben (E 216), které mohou způsobit alergické reakce (které se mohou objevit opožděně).

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Perorální suspenze

150 ml láhev
200 ml láhev
300 ml láhev
600 ml láhev

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím dobře protřepejte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pokud příznaky trvají déle než 7 dnů, poradte se s lékařem.

Přípravek s vysokým obsahem sodíku. Další informace viz příbalová informace. Obsahuje vápník. Pokud Vám bylo doporučeno, abyste dodržoval(a) dietu s omezením solí sodíku a vápníku, poradte se prosím se svým lékařem, dříve než začnete užívat tento přípravek.

Před prvním použitím tohoto přípravku zkontrolujte, zda není poškozený těsnicí kryt.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Chraňte před chladem a mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. (vnější obal)

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č. ČR: 09/1052/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Dospělí a děti věku 12 let a starší: Užívejte 10 – 20 ml (dvě až čtyři 5ml lžíce) po jídle nebo večer před spaním, nebo jak je doporučeno, maximálně čtyřikrát denně.

Děti mladší než 12 let: Používejte pouze na doporučení lékaře.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

gaviscon duo efekt suspenze