

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Minorga 20 mg/ml kožní roztok

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Minoxidilum 20 mg/ml

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Propylenglykol, ethanol, čištěná voda

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1x lahvička o objemu 60 ml.

1 vyjímatelný dávkovač s tryskou a 1 vyjímatelný trubicový dávkovač

3x lahvička o objemu 60 ml.

3 vyjímatelné dávkovače s tryskou a 2 vyjímatelné trubicové dávkovače

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nepolykejte.

Nevdechujte.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Hořlavý přípravek. Chraňte před horkem. Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Laboratoires Bailleul S.A.
10-12 Avenue Pasteur
L-2310 Lucemburk
Lucembursko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

46/244/14-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Tento léčivý přípravek je určen zejména pro muže, kteří trpí ztrátou nebo zeslabením vlasů na temeni hlavy a pro ženy, které trpí celkovým zeslabením vlasů. U většiny pacientů (pacientek) stabilizuje úbytek vlasů.

Aplikujte celkem 1 ml na postižená místa vlasové pokožky hlavy dvakrát denně. Celkové množství nemá překročit 2 ml.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Minorga 20 mg/ml

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

lahvička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Minorga 20 mg/ml kožní roztok

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Minoxidilum 20 mg/ml

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Propylenglykol, ethanol, čištěná voda

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Lahvička 60 ml.

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nepolykejte.
Nevdechujte.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Hořlavý přípravek. Chraňte před horkem. Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Laboratoires Bailleul S.A.
10-12 Avenue Pasteur
L-2310 Lucemburk
Lucembursko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

46/244/14-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Tento léčivý přípravek je určen zejména pro muže, kteří trpí ztrátou nebo zeslabením vlasů na temeni hlavy a pro ženy, které trpí celkovým zeslabením vlasů. U většiny pacientů (pacientek) stabilizuje úbytek vlasů.

Aplikujte celkem 1 ml na postižená místa vlasové pokožky hlavy dvakrát denně. Celkové množství nemá překročit 2 ml.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM