

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Betadine 200 mg vaginální čípky
jodovaný povidon

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden vaginální čípek obsahuje 200 mg jodovaného povidonu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Makrogol 1000

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Vaginální čípek

7 vaginálních čípků

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Vaginální podání
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C)

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Egis Pharmaceuticals PLC
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
Maďarsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 54/386/92-S/C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

K léčbě akutních infekcí pochvy způsobených bakteriemi a/nebo plísněmi u dospělých žen.

Nepoužívejte, pokud jste alergická na jodovaný povidon, při akutních poruchách činnosti štítné žlázy, před, během nebo po léčbě radioaktivním jodem a scintigrafií pomocí radioaktivního jodu, v případě zánětu kůže podobného herpetickému (Dühringova herpetiformní dermatitida), během těhotenství a v období kojení, u dívek v předpubertálním věku nebo pokud používáte přípravky obsahující rtuť.

Doporučená dávka je jeden vaginální čípek jednou denně po dobu 7 dnů.

Pokud se do 4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem používejte tento přípravek nejdéle 7 dnů.

Před použitím je důležité vaginální čípek navlhčit vodou, aby nedošlo k místnímu podráždění. Čípek se zavádí hluboko do pochvy v poloze vleže s pokrčenýma nohama, vždy večer před spaním.

Čípek se před aplikací nesmí zahřívat.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

betadine vaginální čípky

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Betadine 200 mg vaginální čípky
jodovaný povidon

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Egis

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ