

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**

**PAPÍROVÁ KRABÍČKA**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

ASPIRIN C Forte 800 mg/480 mg šumivé tablety

kyselina acetylsalicylová/kyselina askorbová

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jedna šumivá tableta obsahuje 800 mg kyseliny acetylsalicylové a 480 mg kyseliny askorbové (vitamín C).

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Obsahuje sodík. Další informace viz příbalová informace.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH**

10 šumivých tablet

20 šumivých tablet

**5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ**

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**

EXP:

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Bayer s.r.o., Praha, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A)**

07/090/15-C

**13. ČÍLO ŠARŽE**

č.š.

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Indikace:

Aspirin C Forte se užívá

- k symptomatické úlevě od mírné až středně silné bolesti, jako je bolest hlavy, zubů a menstruační bolesti
- při běžném nachlazení nebo příznacích podobných chřipce k symptomatické úlevě od bolesti a horečky.

Neužívejte tento přípravek déle než 3 dny u horečky nebo 3–4 dny při bolesti, pokud to není doporučeno lékařem.

Perorální podání: Šumivá tableta se před užitím musí rozpustit ve sklenici vody. Šumivá tableta se nemá užívat na lačný žaludek, aby se omezilo podráždění žaludku.

Dávkování:

Dospělí

- jednorázová dávka: 1 šumivá tableta  
V případě potřeby lze jednorázovou dávku opakovat v intervalu alespoň 4 hodin mezi dávkami.
- maximální denní dávka: 3 šumivé tablety

Dospívající: 12 let a starší

Síla dávka přípravku Aspirin C Forte (800 mg kyseliny acetylsalicylové/480 mg kyseliny askorbové) nemusí být vhodná pro léčbu dospívajících.

Pro tuto věkovou skupinu jsou k dispozici jiné přípravky, které mají nižší obsah kyseliny acetylsalicylové.

Děti mladší než 12 let

Přípravek Aspirin C Forte nemá být podáván dětem.

U zvláštních populací (pacienti ve věku 65 let, pacienti s nízkou tělesnou hmotností, pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin nebo poruchou kardiovaskulárního oběhu): Podrobnější informace viz příbalová informace.

#### **16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

aspirin c forte

#### **17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

#### **18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH**

**STRIPY**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

ASPIRIN C Forte 800 mg/480 mg šumivé tablety

kyselina acetylsalicylová/kyselina askorbová

**2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Bayer kříž

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

č.š.

**5. JINÉ**