

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

**Strepsils Jahoda bez cukru** 0,6 mg/1,2 mg pastilky  
amylmetacresolum/alcohol 2,4-dichlorobenzyllicus

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

**Složení:**

Jedna pastilka obsahuje amylmetacresolum 0,6 mg, alcohol 2,4-dichlorobenzyllicus 1,2 mg.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: tekuté jahodové aroma (obsahuje benzylalkohol a propylenglykol), růžový anthokyaninový extrakt, sodná sůl sacharinu, kyselina vinná, roztok maltitolu, isomalt.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Pastilka

6, 8, 10, 12, 16, 24, 36 pastilek

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Orální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

### 8. POUŽITELNOST

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č. ČR: 69/468/16-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Úleva od bolesti v krku

Působí proti bakteriím, virům a kvasinkám

Strepsils Jahoda bez cukru se používá k léčbě příznaků zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní, hltanu a k úlevě od bolesti v krku.

Pastilky Strepsils Jahoda bez cukru jsou vhodné pro dospělé, dospívající a děti od 6 let.

**Dávkování:**

Pastilku nechte volně rozpustit v ústech každé 2-3 hodiny.

Dospělí: používejte maximálně 12 pastilek v průběhu 24 hodin.

Dospívající a děti od 6 let: používejte maximálně 6 pastilek v průběhu 24 hodin.

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě. Přetrvávají-li u Vás příznaky onemocnění déle než 3 dny, vyhledejte lékaře.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

strepsils jahoda bez cukru

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH**

**BLISTR**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

**Strepsils Jahoda bez cukru** 0,6 mg/1,2 mg pastilky  
amylmetacresolum/alcohol 2,4-dichlorobenzyllicus

**2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**5. JINÉ**