

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Brufen Combi 500 mg/200 mg potahované tablety

paracetamol/ibuprofen

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 500 mg paracetamolu a 200 mg ibuprofenu.

3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Potahovaná tableta

10 tablet

12 tablet

16 tablet

20 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Tento přípravek se má používat pouze při bolesti mírné až střední intenzity a pouze v případě, že zmírnění bolesti nebylo dostatečné po užití samotného paracetamolu nebo samotného ibuprofenu.

Obsahuje paracetamol.

Vyšší, než doporučené dávky mohou způsobit vážné poškození jater. Neužívejte Brufen Combi, pokud již užíváte jiné léky proti bolesti obsahující paracetamol, jakékoli jiné přípravky snižující bolest, včetně ibuprofenu, vysoké dávky kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních protizánětlivých léků.

Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud trpíte jaterním onemocněním nebo máte problémy s požíváním alkoholu.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Viatrix Limited
Damastown Industrial Park
Mulhuddart, Dublin 15
Dublin, Irsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

07/048/22-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Ke krátkodobé léčbě mírné až středně silné bolesti hlavy (nikoli migrény), bolesti zad, menstruační bolesti, bolesti zubů, svalové bolesti, bolesti spojené s nachlazením a chřipkou a bolesti v krku. Tento přípravek je vhodný zejména při bolestech, které vyžadují silnější analgezii než samotný paracetamol nebo ibuprofen.

Dospělí od 18 let: Užívejte 1 tabletu (nebo 2 pro pacienty s tělesnou hmotností nad 60 kg pokud je to nutné) až 3x denně s **jídlem a zapíjejte ji vodou. Mezi jednotlivými dávkami** ponechte interval nejméně **6 hodin** a neužívejte více než 6 tablet během 24 hodin.

Není určeno pro děti a dospívající do 18 let.

Neužívejte tento přípravek déle než 3 dny. Pokud příznaky onemocnění přetrvávají nebo se zhoršují, poraďte se se svým lékařem.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

brufen combi

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Brufen Combi 500 mg/200 mg potahované tablety

paracetamol/ibuprofen

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Viatrix Limited, Irsko

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ