

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU****KRABIČKA****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Ibalgin 50 mg/g gel  
ibuprofenum

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Ibuprofenum 2,5 g v 50 g gelu (tj. 5%).  
Ibuprofenum 5 g ve 100 g gelu (tj. 5%).

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Gelový základ: hyetelóza, propylenglykol, isopropylalkohol, alkohol (ethanol) 96 %, trolamin, čištěná voda.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Gel  
50 g  
100 g

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Kožní podání.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ****8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Opella Healthcare Czech s.r.o., Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č: 29/197/04-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. Šarže

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Potlačuje bolest svalů a kloubů, tlumí zánět a snižuje otok

Ibalgin gel se používá k místní léčbě poúrazových stavů a následků sportovních úrazů jako jsou otoky, zhmoždění, podvrtnutí kloubu, poranění měkkých částí kloubů.

Obvykle si dospělí a dospívající od 12 let nanášejí na postižené místo 3–4krát denně v časových odstupech 3–4 hodin 4–10 cm dlouhý proužek gelu, který se lehce vtírá.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

ibalgin gel

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU****TUBA****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Ibalgin 50 mg/g gel  
ibuprofenum

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Ibuprofenum 2,5 g v 50 g gelu (tj. 5%).  
Ibuprofenum 5 g ve 100 g gelu (tj. 5%).

**3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK**

Gelový základ: hytelóza, propylenglykol, isopropylalkohol, ethanol 96 %, trolamin, čištěná voda.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Gel  
50 g  
100 g

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Kožní podání.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ****8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Opella Healthcare Czech s.r.o., Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6, Česká republika

**12. REGISTRACNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č.: 29/197/04-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. š.:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Potlačuje bolest svalů a kloubů, tlumí zánět a snižuje otok

Obvykle si dospělí a dospívající od 12 let nanášejí na postižené místo 3–4krát denně v časových odstupech 3–4 hodin 4–10 cm dlouhý proužek gelu, který se lehce vtírá.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**