

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
KRABÍČKA**

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PARALEN GRIP horký nápoj citrón 650 mg/10 mg granule pro perorální suspenzi
paracetamol, phenylephrini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden sáček obsahuje paracetamol 650 mg a phenylephrini hydrochloridum 10 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu, aspartam a sodík.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Granule pro perorální suspenzi

5 sáčků
6 sáčků
10 sáčků
12 sáčků

5. ZPŮSOB A CESTA / CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO
DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním a/nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol.

8. POUŽITELNOST

EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Opella Healthcare Czech s.r.o., Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6, Česká republika / 

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 07/221/05-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

citrón

úleva od chřipky a nachlazení


- snižuje horečku
- odstraňuje bolest hlavy
- uvolňuje ucpaný nos
- uvolňuje vedlejší nosní dutiny
- odstraňuje bolest v krku

Dospělí a dospívající od 15 let užívají 1 sáček rozpuštěný ve sklenici horké vody maximálně 4krát denně, odstup mezi jednotlivými dávkami musí být nejméně 4 hodiny. Vzhledem k obsahu léčivé látky není přípravek vhodný pro děti a dospívající do 15 let. Bez porady s lékařem neužívejte PARALEN GRIP horký nápoj citrón déle než 7 dní.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

paralen grip horký nápoj citrón

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – 2D ČÁROVÝ KÓD

 Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU
SÁČEK**

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

PARALEN GRIP horký nápoj citrón 650 mg/10 mg granule pro perorální suspenzi

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Sáček obsahuje: paracetamol 650 mg, phenylephrini hydrochloridum 10 mg

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu, aspartam a sodík.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

5g

5. ZPŮSOB A CESTA / CESTY PODÁNÍ

PARALEN GRIP horký nápoj citrón je určen pro perorální podání ve formě teplého nápoje.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO
DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST


EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Opella Healthcare Czech s.r.o., Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6, Česká republika / 

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 07/221/05-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

citrón

úleva od chřipky a nachlazení

- snižuje horečku
- odstraňuje bolest hlavy
- uvolňuje ucpaný nos
- uvolňuje vedlejší nosní dutiny
- odstraňuje bolest v krku

Pokyny k použití: nasypete obsah jednoho sáčku do sklenice a zalijte horkou, nikoli vařící vodou. Nechte prášek rozpustit a vypijte.

Dospělí a dospívající od 15 let užívají 1 sáček maximálně 4krát denně, odstup mezi jednotlivými dávkami musí být nejméně 4 hodiny. Nepřekračujte doporučené dávkování. Nepodávejte dětem a dospívajícím do 15 let.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM