

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Metsandia 50 mikrogramů/dávka nosní sprej, suspenze
mometason-furoát

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna odměřená dávka obsahuje monohydrát mometason-furoátu v množství, které odpovídá 50 mikrogramům mometason-furoátu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje: glycerol, polysorbát 80, mikrokrytalickou celulózu a sodnou sůl karmelózy, monohydrát kyseliny citronové, natrium-citrát, čištěnou vodu, benzalkonium-chlorid.
Další údaje viz příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

nosní sprej, suspenze
60 odměřených dávek (10 g suspenze)
120 odměřených dávek (16 g suspenze)

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Nosní podání.
Před použitím lahvičku jemně protřepejte.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nosní aplikátor nepropichujte.

8. POUŽITELNOST

EXP

Spotřebujte do 2 měsíců od prvního použití.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 69/096/21-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Pouze pro dospělé.

Přípravek Metsandia se používá k léčbě:

- dospělých s příznaky senné rýmy (otok nosní sliznice a její podráždění, kýchání, svědění a ucpaný nos nebo výtok z nosu), způsobených vdechováním pylu ze stromů, trav, plevelů, a také spor plísní a hub.

Doporučená dávka je dva vstříky do každé nosní dírky jednou denně.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Metsandia nosní sprej suspenze

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

HDPE LAHVIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Metsandia 50 mikrogramů/dávka nosní sprej, suspenze
mometason-furoát
Nosní podání

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3. POUŽITELNOST

EXP
Spotřebujte do 2 měsíců od prvního použití.

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

60 dávek (10 g suspenze)
120 dávek (16 g suspenze)

6. JINÉ

Pouze pro dospělé.
logo Zentiva