

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
(Krabíčka pro lahvičku s mechanickým rozprašovačem)**

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nasic pro děti 0,5 mg/ml + 50 mg/ml nosní sprej, roztok

xylometazolin-hydrochlorid/dexpanthenol

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml roztoku obsahuje:

0,5 mg xylometazolin-hydrochloridu a 50 mg dexpanthenolu

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: roztok benzalkonium-chloridu, dihydrogenfosforečnan draselný, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, čištěná voda

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Nosní sprej, roztok

10 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Nosní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí!

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

Doba použitelnosti po prvním otevření: 12 týdnů

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH
PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Cassella-med GmbH & Co. KG
Gereonsmühlengasse 1
50670 Kolín nad Rýnem, Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Registrační číslo: 69/323/09-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Dávkování: jeden vstřík do každé nosní dírky až 3krát denně, dle potřeby.


Pro děti ve věku 2 - 6 let.

Ke snížení otoku nosní sliznice při rýmě
K podpoře hojení porušené sliznice

Lahvička s pevně připojeným mechanickým rozprašovačem:

Způsob podání:

Sejměte ochranný kryt z rozprašovače.




Před prvním použitím nosního spreje rozprašovač několikrát stiskněte, dokud se nezačne uvolňovat rovnoměrný aerosol.




Konec rozprašovače vložte do nosní dírky a jednou stiskněte. Během aplikace se lehce nadechujte nosem. Postup opakujte pro druhou nosní díрку. Po použití rozprašovač otřete a nasad'te ochranný kryt.

Lahvička se samostatným mechanickým rozprašovačem (přiloženým v krabici):

Odstraňte protáhlý ochranný kryt. Odstraňte ochranné víčko z hrdla lahvičky a našroubujte mechanický rozprašovač.



Odstraňte ochranný kryt z rozprašovače. Před prvním použitím nosního spreje rozprašovač několikrát stiskněte, dokud se nezačne uvolňovat jemný aerosol.



Přiblížte konec rozprašovače pokud možno svisle do nosní dírky, jednou jej stiskněte a zároveň se lehce nadechujte nosem. Stejný postup opakujte pro druhou nosní díрку. Rozprašovač po použití otřete a nasad'te ochranný kryt.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

nasic pro děti

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU
Lahvička s mechanickým rozprašovačem

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nasic pro děti 0,5 mg/ml + 50 mg/ml nosní sprej, roztok

xylometazolin-hydrochlorid/dexpanthenol

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml roztoku obsahuje:

0,5 mg xylometazolin-hydrochloridu a 50 mg dexpanthenolu

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: roztok benzalkonium-chloridu, dihydrogenfosforečnan draselný, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, čištěná voda

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Nosní sprej, roztok

10 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Nosní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí!

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

Doba použitelnosti po prvním otevření: 12 týdnů

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Cassella-med GmbH & Co. KG
Kolín nad Rýnem, Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Registrační číslo: 69/323/09-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Pro děti ve věku 2 – 6 let.

Ke snížení otoku nosní sliznice při rýmě.

K podpoře hojení porušené sliznice.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM