

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
(krabička)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Panadol Extra Rapide 500 mg/65 mg šumivé tablety
paracetamol/kofein

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Léčivé látky: Jedna šumivá tableta obsahuje 500 mg paracetamolu a 65 mg kofeinu.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje též 427 mg sodíku, sorbitol aj.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

šumivé tablety
12 (24) tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu, trpíte jaterním onemocněním nebo užíváte jiná léčiva obsahující paracetamol.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Haleon Czech Republic s.r.o.,
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

logo Haleon

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 07/748/95-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Zesílený účinek proti bolesti
Rychlý nástup účinku
Nedráždí žaludek

Panadol Extra Rapide obsahuje kombinaci dvou léčivých látek, která je účinná proti bolesti.

Panadol Extra Rapide šumivé tablety umožňují rychlejší vstřebávání, a tím i nástup účinku.

Panadol Extra Rapide je vhodný k úlevě při bolestech hlavy (včetně migrény), bolesti zad, zubů a bolesti při menstruaci. Přináší též úlevu od nepříjemných příznaků chřipky a nachlazení, jako jsou bolesti svalů, kloubů a bolest v krku a snižuje horečku.

Dávkování

Dospělí a dospívající od 15 let: 1 – 2 tablety rozpuštěné ve skleničce vody až 4x denně. Dávky opakujte nejdříve po 4 hodinách. 1 tableta je vhodná u osob s tělesnou hmotností 34 – 60 kg, 2 tablety u osob s tělesnou hmotností nad 60 kg. Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 tablety. Maximálně 8 tablet za 24 hodin.

Děti 12 – 15 let: 1 tabletu rozpuštěnou ve skleničce vody nejvýše 6x denně. Dávky opakujte nejdříve po 4 – 6 hodinách. Maximálně 6 tablet za 24 hodin.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

panadol extra rapide

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

(blistr)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Panadol Extra Rapide 500 mg/65 mg šumivé tablety
paracetamol/kofein

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Haleon Czech Republic s.r.o.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ

logo Haleon