

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA NA OBALU

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Řepíková nat'

Léčivý čaj

Agrimoniae herba

Perorální, orální a kožní podání

SLOŽENÍ

Agrimoniae herba 50 g

POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný vnitřně: jako pomocný prostředek při lehkých nespecifických průjemových onemocněních.

Zevně: při lehkých zánětech dutiny ústní a lehkých zánětlivých onemocněních kůže.

Přípravek mohou užívat dospívající od 12 let a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

PŘÍPRAVA A DÁVKOVÁNÍ

Vnitřně: 1 čajová lžička řepíkové nati se přelije 0,25 l vroucí vody, nechá se 15 min vyluhovat v zakryté nádobě a pak se scedí. Čaj se pije teplý 2 – 3x denně.

Zevně: 2 polévkové lžíce řepíkové nati se vaří v 0,5 l vody a po 10 min varu se nat' nechá 15 min vyluhovat v zakryté nádobě, pak se scedí. Teplý odvar se používá několikrát denně ke kloktání, obkladům, případně koupelím.

Nálev i odvar se připravují vždy čerstvé, bezprostředně před použitím.

Délka léčby:

Vnitřní užití (při průjmech): Pokud u Vás příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají déle než 2 – 3 dny, poraďte se s lékařem. Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 3 dny.

Zevní užití: Pokud u Vás příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají déle než 7 dní, poraďte se s lékařem. Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 2 týdny.

KONTRAINDIKACE

Neužívejte při přecitlivělosti na léčivou látku.

Zevně: Neužívejte na velkoplošná poškození kůže nebo mokvající ekzémy.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky:
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

INTERAKCE

Nejsou známy.

UPOZORNĚNÍ

Pokud se během užívání přípravku při průjmu u Vás objeví horečka, krev ve stolici nebo zvracení, ihned navštivte lékaře.

Vzhledem k nedostatku údajů se užívání v době těhotenství a kojení nedoporučuje.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

VELIKOST BALENÍ

50 g

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/925/97-C

Č. ŠARŽE

POUŽITELNÉ DO

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Megafyt Pharma s.r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU NA OBALU

ŘEPÍKOVÁ NAŤ

DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

5.11.2014