

## Příbalová informace – informace pro pacienta

**Mesocain 10 mg/g + 2 mg/g gel**  
trimecaini hydrochloridum/carbethopendecini bromidum

**Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.**

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

### Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Mesocain a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mesocain používat
3. Jak se přípravek Mesocain používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Mesocain uchovávat
6. Obsah balení a další informace

#### 1. Co je přípravek Mesocain a k čemu se používá

Přípravek Mesocain má dobré anestetické a antiseptické účinky (působí tlumivě na grampozitivní koky, především na stafylokoky) a díky své konzistenci působí jako lubrikant (zvyšuje klouzavost) při některých typech vyšetření močového ústrojí a trávicího ústrojí.

Přípravek se používá ke zlepšení klouzavosti zaváděných cévek, prevenci bolesti při instrumentálním urologickém vyšetření (anestezie sliznice močové trubice před dilatací (rozšiřováním) cévkováním), zlepšení klouzavosti nástrojů a zmírnění bolestivosti při vyšetřování trávicího ústrojí. Přípravek je vhodný pro dospělé, děti i dospívající.

#### 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mesocain používat

##### Nepoužívejte přípravek Mesocain:

- jestliže jste alergický(á) na trimecain-hydrochlorid, carbethopendecinium-bromid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
- jestliže jste alergický(á) na znečítlivující látky (anestetika) nebo protimikrobiální látky (antiseptika),
- pokud máte jakákoliv poranění, zejména hnisavá, na sliznicích ve vyšetřované oblasti.

##### Upozornění a opatření

Před použitím se poraďte se svým lékařem, jestliže máte:

- srdeční problémy,
- onemocnění jater,
- epilepsii.

### **Další léčivé přípravky a přípravek Mesocain**

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Interakce s jinými léčivými přípravky nebyly pozorovány.

### **Přípravek Mesocain s jídlem a pitím**

Přípravek Mesocain lze používat nezávisle na jídle a pití.

### **Těhotenství, kojení a plodnost**

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Lékař posoudí poměr rizika možných nežádoucích účinků a prospěchu z použití přípravku.

### **Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů**

Přípravek nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla ani na schopnost obsluhovat stroje.

**Přípravek Mesocain obsahuje methylparaben**, který může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

## **3. Jak se přípravek Mesocain používá**

Vždy použijte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

### Urologické vyšetření

Po očištění vnějšího ústí močové trubice a špičky penisu antiseptickým roztokem se aplikátorem vytlačí gel přímo z tuby do močové trubice. Případnému zpětnému vytékání gelu lze zabránit nasazením svorky na penis, podvázáním obvazem nebo ručním stlačením.

### Vyšetření trávicího ústrojí

Přípravek se nanáší na konec vyšetřovacího nástroje (endoskopu) při vyšetření jícnu a žaludku nebo se používá jako lubrikant při vyšetření konečníku a tlustého střeva.

### **Jestliže jste použil(a) více přípravku Mesocain, než jste měl(a)**

Při vstřebání většího množství přípravku Mesocain může dojít k místní precitlivělosti projevující se zarudnutím sliznice.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

## **4. Možné nežádoucí účinky**

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při používání přípravku Mesocain se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle frekvence výskytu:

Vzácné (vyskytují se u 1 -10 pacientů z 10 000):

- snížení krevního tlaku,
- zúžení průdušek - dušnost, sípání,
- zvýšená činnost střev,
- místní přecitlivělost projevující se zarudnutím sliznice (jen při vstřebání větších množství léčivých látek),
- otok podkožní a podslizniční tkáně, nejčastěji v oblasti obličeje, rtů a jazyka,
- svědivá vyrážka.

#### Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
 Šrobárova 48  
 100 41 Praha 10  
 webové stránky: [www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek](http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek)

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

### **5. Jak přípravek Mesocain uchovávat**

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

### **6. Obsah balení a další informace**

#### **Co přípravek Mesocain obsahuje**

Léčivými látkami jsou trimecaini hydrochloridum a carbethopendeciniu bromidum. Dvacet gramů gelu obsahuje trimecaini hydrochloridum 200 mg a carbethopendeciniu bromidum 40 mg.

Pomocnými látkami jsou hyetelosa, methylparaben (E218) a voda pro injekci.

#### **Jak přípravek Mesocain vypadá a co obsahuje toto balení**

Popis: čirý, průhledný gel

Velikost balení: 20 g

#### **Držitel rozhodnutí o registraci**

Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

#### **Výrobce**

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

**Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20. 4. 2020**