

Příbalová informace: informace pro pacienta

Ophthalm-Framykoin comp. 250 IU/g + 5,2 mg/g + 5 mg/g oční mast bacitracinum zincicum/neomycini sulfas/hydrocortisoni acetat

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Ophthalm-Framykoin comp. a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalm-Framykoin comp. používat
3. Jak se přípravek Ophthalm-Framykoin comp. používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Ophthalm-Framykoin comp. uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Ophthalm-Framykoin comp. a k čemu se používá

Oční mast Ophthalm-Framykoin comp. obsahuje bacitracin a neomycin, kombinaci antibiotik se širokým spektrem účinku, která je doplněna o hydrokortison, kortikosteroidní hormon s protizánětlivým a protialergickým účinkem. Mast je určena k léčbě těch očních onemocnění, kde se vedle infekce výrazně projevuje alergická a zánětlivá složka.

Ophthalm-Framykoin comp. se používá u dospělých, dospívajících i dětí při zánětech očního víčka, spojivky, rohovky, zánětu rohovky nevirového původu, vředu na okraji rohovky s počínajícím zánětem oční duhovky, zánětech na povrchu bělimy, zánětech duhovky a řasnatého tělíska. Mast lze použít i při zánětech a prasklinách nosního vchodu a zánětech zevního zvukovodu. Mast je vhodná i pro děti a starší pacienty.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalm-Framykoin comp. používat

Nepoužívejte přípravek Ophthalm-Framykoin comp.

- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
- při přecitlivělosti na tzv. aminoglykosidová antibiotika,
- při oparu rohovky, pravých a planých neštovicích, při virových onemocněních a vleklých zánětech předního úseku oka, plísňových onemocněních oka, tuberkulózních zánětech,
- při změnách rohovky spojených s jeho nedostatečnou výživou.

Upozornění a opatření

Pro použití Ophthalm-Framykoinu comp. u nemocných s glaukomem (zelený zákal) a kataraktou (šedý zákal) musí být zvlášť závažné důvody.

Váš lékař má být proto informován o všech Vašich onemocněních, dále o případném těhotenství či kojení, aby mohl zvážit používání tohoto přípravku.

Není vhodná aplikace na rozsáhlé mokvající plochy pro možnost vstřebání.

Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Ophthalm-Framykoin comp.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku Ophthalm-Framykoin comp. a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Jedná se o tetracyklinová antibiotika a chloramfenikol, které snižují antibiotické účinky přípravku Ophthalm-Framykoin comp. Rovněž není vhodné nanášet mast současně s jinými přípravky pro místní používání, aby nedošlo k naředění masti, které by vedlo ke snížení antibakteriálního účinku.

Bez porady s lékařem nepoužívejte současně s přípravkem Ophthalm-Framykoin comp. žádné volně prodejné léky.

Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaké jiné léky, včetně léků pro oční, případně nosní nebo ušní podání, oznamte mu, že používáte Ophthalm-Framykoin comp.

Přípravek Ophthalm-Framykoin comp. s jídlem a pitím

Při používání přípravku Ophthalm-Framykoin comp. můžete jíst a pít normálně.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, porad'te se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Váš lékař má být informován o případném těhotenství či kojení, aby mohl zvážit používání tohoto přípravku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje pozornost. Bezprostředně po aplikaci masti dochází přechodně k rozmazanému vidění, které ve velmi krátké době odezní.

Přípravek Ophthalm-Framykoin comp. obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin) a cetylalkohol

Tuk z ovčí vlny (lanolin) a cetylalkohol mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3. Jak se přípravek Ophthalm-Framykoin comp. používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), porad'te se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Neurčí-li lékař jinak, 1–2 cm oční masti se u dospělých i dětí obvykle vnáší vždy po 2–3 hodinách (nejméně 4krát denně) do spojivkového vaku.

Je vhodné po vnesení masti do oční štěrby nechat zavřené oko na 2–3 minuty, aby léčivé látky neodtekly se slzami a mohly se vstřebat rohovkou a spojivkou. Při používání dvou či více očních mastí je nutné mezi jejich použitím nechat uplynout alespoň 10 minut.

Při zánětech a prasklinách nosního vchodu a zánětech zevního zvukovodu se mastí potírá nemocná plocha 5–6krát denně.

Mast se nepoužívá déle než 5–7 dnů.

Před prvním použitím se doporučuje vytlačit a odstranit asi 1 cm masti (z důvodu odstranění kapky olejového podílu vazelíny).

Při používání oční masti se nesmí používat kontaktní čočky.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Ophthalm-Framykoin comp., než jste měl(a)

Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k pocitu na zvracení a zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit a vyhledat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ophthalm-Framykoin comp.

Při vynechání dávky použijte mast co nejdříve, jakmile si vzpomenete. Blíží-li se doba pro použití další dávky, pak následující dávku vynechejte.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Ophthalm-Framykoin comp.

Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu používání přípravku, i když se budete cítit lépe.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při používání přípravku Ophthalm-Framykoin comp. se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky. Frekvenci výskytu nelze z dostupných dat určit.

Po nanesení masti do spojivkového vaku může oční mast u citlivějších pacientů vyvolat přechodný pocit pálení, zánět víčka, alergický zánět spojivky, zvýšení nitroočního tlaku, rozmazané vidění. Výjimečně se mohou objevit alergické reakce (svědění, vyrážka, zčervenání oka, otok či jiné příznaky dráždění, které nebyly přítomny před použitím masti). Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí léčbu přerušte a ihned se poraďte s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Ophthalm-Framykoin comp. uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ophthalm-Framykoin comp. obsahuje

- Léčivými látkami jsou bacitracinum zincicum., neomycini sulfas, hydrocortisoni acetatas.
- Jeden gram masti obsahuje bacitracinum zincicum 250 IU, neomycini sulfas 5,2 mg (= neomycinum 1 000 IU/16,5 mg), hydrocortisoni acetatas 5 mg.
- Pomocnými látkami jsou tuk z ovčí vlny (lanolin), tvrdý parafin, bílý vosk, cetylalkohol, bílá vazelína.

Jak přípravek Ophthalm-Framykoin comp. vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: suspenzní mast světle žluté barvy, konzistence bílé vazelíny.

Druh obalu: hliníková tuba, krabička.

Velikost balení: 5 g oční masti.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 28. 12. 2020.