

Fenylketonurie / Fenylketonúria

VÝŽIVOVÉ ÚDAJE	Na 100 g	Na 16,5 g*	
Energie / Energia	kJ / kcal	1695 / 405	280 / 67
Tuky: z toho:	g	14,3	2,4
nasýtené / nasýtené	g	1,5	0,25
Sacharidy: z toho:	g	38,9	6,4
cukry	g	3,8	0,6
Bílkovinný / Bielkovinový ekvivalent	g	30	5,0
L-fenylalanín / L-fenylalanín**	g	-	-
Sól / Soľ	g	0,9	0,15

Vitamíny	µg RE	416	68,6
Vitámín A	µg	15	2,5
Vitámín D	µg	7,8	1,3
Vitámín E	mg α TE	54	8,9
Vitámín C	mg	50	8,3
Vitámín K	µg	1,0	0,17
Thiamín / Vitamín B1	mg	1,2	0,20
Riboflavin / Vitamín B2	mg	8,5	1,4
Niacin / Niacin	mg	1,4	0,23
Vitámín B6	µg	280	46,2
Kyselina listová	µg	2,4	0,40
Vitámín B12	µg	60	9,9
Biotin / Biotín	µg	4,0	0,66
Kyselina pantoténová / pantoténová	mg	300	49,5
Cholin / Cholin	mg	60	9,9
Inositol / Inozitol	mg		

Minéralni / Minerálne látky	mg	360	59,4
Sodík	mg	522	86,1
Draslík	mg	460	75,9
Chlorid	mg	850	140
Vápnik / Vápnik	mg	624	103
Fosfor	mg	150	24,8
Hořčík / Hořčík	mg		

Stopové prvky	mg	10,8	1,8
Železo	µg	900	149
Meď / Meď	µg	10,8	1,8
Zinek / Zinok	µg	1,6	0,26
Mangan / Mangán	µg	126	20,8
Jód	µg	72	11,9
Molybden / Molybdén	µg	38	6,3
Selen / Selén	µg	44	7,3
Chrom / Chrom	µg		

Osmolalita: 33 g (2 odměrky / odmerky) + 135 ml vody = 862 mOsm/kg
*(1 odměrka / odmerka)

příchut/příchut
Vanilka



trio™

Potravina pro zvláštní lékařské účely Potraviny na osobitné lékařské účely

PKU Trio je prášek na bázi aminokyselin bez fenylalaninu**, obsahuje esenciální a neesenciální aminokyseliny, sacharidy, tuky, vitamíny, minerální látky, stopové prvky a kyselinu dokosahexaenovou (DHA).

Od tří let. / PKU Trio je prášek na báze aminokyselin, bez fenylalaninu**, obsahuje esenciální a neesenciální aminokyseliny, sacharidy, tuky, vitamíny, minerální látky, stopové prvky a kyselinu dokosahexaenovou (DHA). Od troch rokov.

PKU Trio je potravina pro zvláštní lékařské účely určená pro řízení dietní výživy při fenylketonurii (PKU). / PKU Trio je potravina na osobitné lékařské účely, určená na dietny režim pri fenylketonúrii (PKU).



Innovation in Nutrition

Hmotnost / Hmotnosť:
e 400 g

Odměrka přiložena
Odměrka priložena

Minimální trvanlivost do konce:
Minimálna trvanlivosť do konca:
Číslo šarže:

viz / pozri dno
plechovky

Dávkování / Dávkovanie

Dávkování určí lékař po příslušném klinickém stanovení. Dávkování se mění v závislosti na věku, tělesné hmotnosti a klinickém stavu pacienta. / Dávkovanie určí lekár po príslušnom klinickom stanovení. Dávkovanie sa mení v závislosti od veku, telesnej hmotnosti a klinického stavu pacienta.

Návod k přípravě / Návod na prípravu

Obsah dvou odměrek / Dvoch odmeriek
= 10 g BÍLKOVINOVÉHO / BIELKOVINOVÉHO EKVIVALENTU

1. Dvě odměrky prášku vsypte do sklenice. / Dve odmerky prášku vsypte do pohára.
2. Přidejte přibližně 135 ml studené vody. / Pridajte približne 135 ml studenej vody.
3. Míchejte do úplného rozpuštění prášku. / Miešajte do úplného rozpustenia prášku.
4. Ihned konzumujte. / Ihneď konzumujte.



Složení: sušený glukózový sirup, rostlinné oleje (slunečnicový olej s vysokým obsahem kyseliny olejové, sójový), L-lysin-L-aspartát, L-leucin, L-thyrosin, glycin, vápenaté soli kyseliny fosforečné, L-arginin-L-aspartát, L-valin, L-glutamin, L-prolin, L-threonin, L-isoleucin, L-serin, citrónan sodný, L-alanin, chlorid draselný, L-histidin, hořčičnaté soli kyseliny fosforečné, aroma, cholin bitartrát, L-cystin, L-tryptofan, olej z *Cryptocodium cohni*, L-methionin, L-arginin, emulgátor (E 472c), zahušťovadlo (E 415), maltodextrin, octan hořčičný, kaseinát sodný (z MLEKA), L-askorbová kyselina, glukonan zinečnatý, inositol, taurin, L-askorbát sodný, L-karnitin-L-vin, síran železnatý, sladidlo (sukralóza), draselné soli kyseliny fosforečné, DL-α-tokoferyl-acetát, emulgátor (E 471), glukonan manganatý, nikotinamid, glukonan měďnatý, retinyl-acetát, D-pantothénát vápenatý, konzervant (E 307), pyridoxin-hydrochlorid, thiamin-hydrochlorid, riboflavin, folát, chlorid chromitý a jeho hexahydrát, jodid draselný, molybdenan sodný, seleničtan sodný, D-biotin, vitamin K, cholekalciferol, vitamin B12, antioxidant (E 304). / **Zloženie:** sušený glukózový sirup, rastlinné oleje (slnečnicový s vyšším podielom kyseliny olejovej, sójový), L-lyzín-L-aspartát, L-leucín, L-thyrozín, glycín, vápenaté soli kyseliny ortofosforečnej, L-arginín-L-aspartát, L-valín, L-glutamín, L-prolín, L-treonín, L-isoleucín, L-serín, citrón sodný, L-alanín, chlorid draselný, L-histidín, hořčičnaté soli kyseliny ortofosforečnej, aroma, cholin dvojvlákn, cystín, L-tryptofán, olej z *Cryptocodium cohni*, L-metionín, L-arginín, emulgátor (E 472c), zahusťovadlo (E 415), maltodextrín, octan hořčičný, kaseinát sodný (z MLEKA), kyselina L-askorbová, glukonan zinočnatý, inozitol, taurín, L-askorbán sodný, L-karnitín-L-vin, síran železnatý, sladidlo (sukralóza), draselné soli kyseliny ortofosforečnej, DL-alfa-tokoferylacetát, emulgátor (E 471), glukonan mangánatý, nikotinamid, glukonan meďnatý, retinylacetát, D-pantoténát vápenatý, konzervačná látka (E 307), pyridoxínhydrochlorid, tiámínhydrochlorid, riboflavin, folát, chlorid chromitý (III) a jeho hexahydrát, jodid draselný, molybdenan sodný, seleničtan sodný, biotín, vitamin K, cholekalciferol, vitamin B12, antioxidant (E 304).

**Bez prídavku fenylalanínu. Fenylalanín môže byť prítomný v stopovom množstve z iných ingrediencií (< 10 mg/100 g prášku; < 3 mg/100 ml). / Bez prídavku fenylalanínu. Fenylalanín môže byť prítomný v stopovom množstve z iných ingrediencií (< 10 mg/100 g prášku; < 3 mg/100 ml).

VitaFlo International Ltd., Suite 1.11, South Harrington Building, 182 Sefton Street, Brunswick Business Park, Liverpool, L3 4BQ, Velká Británie / Velká Británie.
Web: www.vitafloweb.com; E-mail: vitaflo@vitaflo.co.uk
Distributor: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, Česká republika. Tel.: 800 135 135
Distribútor: Nestlé Slovensko s.r.o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, Slovenská republika. Tel.: 0800 135 135

*Reg. Trademark of Societate des Produits Nestlé S.A.

Příprava více porcí / Příprava viac porcií

Odměňte požadovaný počet odměrek a přidejte odpovídající množství vody. Míchejte do úplného rozpuštění prášku. Nezkonzumované porce PKU Trio uzavřete, skladujte v chladničce a spotřebujte do 24 hodin. Před konzumací dobře protřepte, anebo promíchejte. / Odměřajte požadovaný počet odmeriek prášku a pridajte zodpovedajúce množstvo vody. Miešajte do úplného rozpustenia prášku. Nezkonzumované porcie PKU Trio uzavrite, skladujte v chladničke a spotrebujte do 24 hodín. Pred konzumáciou dobre potrepte, alebo premiešajte.

Důležité upozornění / Dôležité upozornenie

PKU Trio může být konzumována pouze jedinci s prokázanou fenylketonurií pod přísným lékařským dohledem. Potravina je vhodná od tří let. Dieta musí být doplněna o přirozené zdroje bílkovin, vodu a další nutrienty ve stanoveném množství tak, aby byl zabezpečen přísun fenylalaninu, tekutin a všeobecných požadavků na výživu. PKU Trio mohou konzumovat ženy během těhotenství. Potravina není vhodná jako jediný zdroj výživy. Potravina není určena pro parenterální použití! Nespotřebované porce skladujte v chladničce a spotřebujte do 24 hodin. / PKU Trio môže byť konzumovaná iba jedincami s dokázanou fenylketonúriou pod prísnym lekárskeym dohľadom. Potravina je vhodná od troch rokov. Dieta musí byť doplnená o prirodzené zdroje bielkovín, vodu a ďalšie živiny v predpísanom množstve na udržanie nevyhnutného príjmu fenylalanínu, tekutín a na pokrytie všeobecných výživových požiadaviek. PKU Trio môžu konzumovať ženy počas tehotenstva. Potravina nie je vhodná ako jediný zdroj výživy. Neslúži na parenterálne použitie! Nespotrebované porcie skladujte v chladničke a spotrebujte do 24 hodín.

Skladování / Skladovanie

Neotevřené: uchovávejte v suchu při pokojové teplotě. Po otevření: spotřebujte do 1 měsíce. Baleno v ochranné atmosféře. / Neotvorené: skladujte v suchu pri izbovej teplote. Po otvorení: spotrebujte do 1 mesiaca. Balené v ochrannej atmosfére.

