

## PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA NA OBALU

### NÁZEV PŘÍPRAVKU TORMENTAN

při průjmech a nadýmání

Léčivý čaj  
Perorální podání

#### SLOŽENÍ

1 nálevový sáček obsahuje: Myrtilli fructus 0,480 g (borůvkový plod), Tormentillae rhizoma 0,300 g (nátržníkový oddenek), Sanquisorbae radix 0,300 g (krvavcový kořen), Matricariae flos 0,105 g (heřmánkový květ), Salviae officinalis folium 0,105 g (list šalvěje lékařské), Menthae pip. herba 0,105 g (nat' máty peprné), Liquiritiae radix 0,105 g (lékořicový kořen) v 1,5g nálevovém sáčku.

#### SLOŽENÍ

Myrtilli fructus 32,0 g (borůvkový plod), Tormentillae rhizoma 20,0 g (nátržníkový oddenek), Sanquisorbae radix 20,0 g (krvavcový kořen), Matricariae flos 7,0 g (heřmánkový květ), Salviae officinalis folium 7,0 g (list šalvěje lékařské), Menthae pip. herba 7,0 g (nat' máty peprné), Liquiritiae radix 7,0 g (lékořicový kořen) ve 100g čajové směsi.

#### POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný při průjmech. Působí proti nadýmání a plynatosti, uvolňuje napětí v bříše.

Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající od 12 let.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

#### PŘÍPRAVA A DÁVKOVÁNÍ

##### Pokud lékař neurčí jinak:

1 nálevový sáček se přelije šálkem (1/4 l) vařící vody a po 15 minutách vyluhování v přikryté nádobě se vyjmě, čaj se nesmí vařít.

Čaj se pije teplý, neslazený, po jídle. Připravuje se vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Dávkování:

Dospělí a dospívající od 12 let: 3x denně.

#### PŘÍPRAVA A DÁVKOVÁNÍ

##### Pokud lékař neurčí jinak:

1 polévková lžíce se přelije šálkem (1/4 l) vařící vody a po 15 minutách vyluhování v přikryté nádobě se scedí, čaj se nesmí vařít.

Čaj se pije teplý, neslazený, po jídle. Připravuje se vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Dávkování:

Dospělí a dospívající od 12 let: 3x denně.

Bez porady s lékařem užívejte Tormentan nejdéle 2-3 dny. Pokud se během této doby příznaky

nezlepší nebo se zhoršují, vyhledejte lékaře.

## KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte při přecitlivělosti na některou složku přípravku nebo na menthol. Směs obsahuje šalvějový list a lékořicový kořen, které se nesmí používat v těhotenství a v době kojení.

## NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nátržníkový oddenek může u osob citlivých na tráviny vyvolat zažívací obtíže, jako je nevolnost nebo zvracení. U heřmánu byly velmi vzácně zaznamenány případy závažné alergické reakce (anafylaktický šok- závažná, život ohrožující alergická reakce, astma, otok obličeje a kopřivka).

## Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky: [www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek](http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek).

Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

## INTERAKCE

Šalvěj může ovlivnit účinek léků ovlivňujících tzv. GABA receptory (např. barbituráty nebo benzodiazepiny, užívané k léčbě úzkosti nebo nespavosti). Souběžné užívání s Tormentanem se proto nedoporučuje. Neužívejte současně s jinými léky, ale dodržte odstup minimálně jednu hodinu před nebo po podání jiných léků.

## UPOZORNĚNÍ

Pokud se během užívání přípravku objeví horečka, krev ve stolici nebo zvracení, ihned navštivte lékaře.

Pokud trpíte gastroezofageálním refluxem (návrat žaludečního obsahu zpět do jícnu, projevující se pálením žáhy), Vaše potíže by mohly zesítit, a proto se užívání tohoto přípravku nedoporučuje.

Při žlučníkových kamenech či jiných onemocněních žlučových cest konzultujte používání čaje s lékařem.

Reakce z přecitlivělosti na samotný heřmánek (např. kontaktní dermatitida) jsou velice vzácné. Byly však velmi vzácně zaznamenány případy anafylaktického šoku a astmatu. Křížové reakce mohou nastat i u lidí s alergií na rostliny z čeledi Asteraceae (hvězdnicovité) (např. *Artemisia* - pelyněk).

Pokud příznaky onemocnění při používání tohoto tradičního rostlinného přípravku přetrívají nebo pokud se objeví nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

## UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**VELIKOST BALENÍ**

20 nálevových sáčků po 1,5 g

Hmotnost náplně 30,0 g

**VELIKOST BALENÍ**

Hmotnost náplně 100,0 g

**REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

Reg. č.: 94/626/69-C

**Č.sarže**

**POUŽITELNÉ DO**

**DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

LEROS, s.r.o.

U Národní galerie 470

156 00 Praha 5 – Zbraslav

Česká republika

e-mail: [leros@leros.cz](mailto:leros@leros.cz)

**VÝROBCE**

**LEROS, s.r.o**

**B. Hrejsové 1301**

**696 62 Strážnice**

**INFORMACE V BRAILLOV2 PÍSMU NA OBALU**

**tomentan**

**DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU**

3. 5. 2024