

Příbalová informace: informace pro uživatele

Mikronizované flavonoidy AGmed 500 mg potahované tablety

mikronizované flavonoidy (obsahující 90 % diosminu a 10 % ostatních flavonoidů vyjádřených jako hesperidin)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Mikronizované flavonoidy AGmed a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mikronizované flavonoidy AGmed užívat
3. Jak se přípravek Mikronizované flavonoidy AGmed užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Mikronizované flavonoidy AGmed uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Mikronizované flavonoidy AGmed a k čemu se používá

Mikronizované flavonoidy AGmed obsahuje mikronizované flavonoidy, které obsahují diosmin a ostatní flavonoidy vyjádřené jako hesperidin. Mikronizované flavonoidy AGmed patří do skupiny přípravků označovaných jako vasoprotektiva, která stabilizují kapiláry (krevní vlásečnice), zvyšují jejich odolnost, a zvyšují napětí žilní stěny. Omezuje tvorbu otoků.

Mikronizované flavonoidy AGmed se používá u dospělých k léčbě následujících stavů:

- Léčba chronické žilní nedostatečnosti dolních končetin s následujícími příznaky: pocit tíhy v nohou, otok nohou, bolest, noční křeče nohou.
- léčba příznaků akutní ataky hemoroidálního onemocnění (tj. uzlovitých žilních rozšíření v oblasti konečníku). Hemoroidy jsou doprovázeny příznaky jako je svědění, bolest či krvácení v oblasti konečníku a potíže s vyprazdňováním.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mikronizované flavonoidy AGmed užívat

Neužívejte přípravek Mikronizované flavonoidy AGmed :

- jestliže jste alergický(á) na mikronizované flavonoidy (diosmin nebo hesperidin) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Mikronizované flavonoidy AGmed se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Akutní ataka hemoroidálního onemocnění:

Pokud máte akutní ataku hemoroidálního onemocnění, můžete užívat přípravek Mikronizované flavonoidy AGmed jen krátkou dobu. Pokud nedošlo k žádnému zlepšení, poraďte se s lékařem. Pokud se Váš stav v průběhu léčby zhoršuje, tj. pokud pozorujete zvýšené krvácení z konečníku, krev ve stolici nebo máte podezření na krvácející hemoroidy, konzultujte to s lékařem. Léčba přípravkem Mikronizované flavonoidy AGmed nenahrazuje specifickou léčbu jiných onemocnění konečníku.

Chronická žilní nedostatečnost:

V případě žilní nedostatečnosti by měla být léčba kombinována se zdravým životním stylem, abyste dosáhl(a) co nejlepších výsledků. Vyhněte se nadměrnému pobytu na slunci, nadměrnému teplu, dlouhému stání, nadváze. Chůze a používání speciálních (kompresivních) punčoch může zlepšit krevní oběh v dolních končetinách.

Pokud se Váš stav v průběhu léčby zhoršuje, což se může projevit jako zánět kůže, zánět žil, tvrdnutí podkožní tkáně, silná bolest, kožní vředy nebo atypické příznaky, např. náhlý otok jedné nebo obou nohou, musíte to konzultovat s lékařem co nejdříve.

Mikronizované flavonoidy AGmed není účinný při snižování otoků dolních končetin, pokud jsou způsobeny onemocněním srdce, jater nebo ledvin.

Máte-li jakékoli otázky, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Mikronizované flavonoidy AGmed

Interakce nejsou dosud známy.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství: Podávání přípravku Mikronizované flavonoidy AGmed v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje.

Kojení: Vzhledem k chybějícím údajům o vylučování léčivé látky do lidského mateřského mléka se ohledně možnosti kojení při probíhající léčbě poraďte s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Mikronizované flavonoidy AGmed nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 23 mg sodíku v jedné dávce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

3. Jak se přípravek Mikronizované flavonoidy AGmed užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

- Při léčbě chronické žilní nedostatečnosti je doporučená dávka 2 tablety denně užit v jedné dávce nebo dvou oddělených dávkách (1 tableta ráno a 1 tableta večer).
- V případě akutního zánětu hemoroidů se užívá 6 tablet denně (tj. 3 tablety 2krát denně) po dobu prvních 4 dnů, poté 4 tablety denně (tj. 2 tablety 2krát denně) po dobu následujících 3 dnů. Udržovací dávka je 2 tablety denně (tj. 1 tableta 2krát denně). V této indikaci je přípravek Mikronizované flavonoidy AGmed určen pouze pro krátkodobou léčbu.

Způsob podání

Tablety se užívají při jídle a zapíjejí se tekutinou.

Délka léčby

Užívejte přípravek Mikronizované flavonoidy AGmed každý den tak dlouho, jak Vám řekne lékař. Nepřestávejte s léčbou bez předchozí konzultace s lékařem. Pokud máte nějaké otázky týkající se délky léčby, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Mikronizované flavonoidy AGmed, než jste měl(a)

Pokud jste si vzal(a) více tablet přípravku Mikronizované flavonoidy AGmed, než jste měl(a), okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Nejčastěji hlášené příznaky zahrnují průjem, pocit na zvracení, bolest břicha, svědění a vyrážku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Mikronizované flavonoidy AGmed

Pokud jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete. Je-li již téměř čas na další dávku, vynechanou dávku neužívejte a vezměte si následující dávku v obvyklém čase.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Níže je uveden seznam hlášených nežádoucích účinků:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

Průjem, trávicí obtíže, pocit na zvracení, zvracení

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

Zánět tlustého střeva

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob)

Závratě, bolest hlavy, pocit neklidu

Vyrážka, svědění, kopřivka

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):

Bolest břicha.

Ojedinelý otok obličeje, rtů, víček. Výjimečně Quinckeho edém (náhlý otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku, který může způsobit obtíže při dýchání).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: <http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek>. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Mikronizované flavonoidy AGmed uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Mikronizované flavonoidy AGmed obsahuje

- Léčivou látkou jsou mikronizované flavonoidy (obsahující 90 % diosminu a 10 % ostatních flavonoidů vyjádřených jako hesperidin).
Jedna potahovaná tableta obsahuje 500 mg mikronizovaných flavonoidů (obsahujících 450 mg diosminu a 50 mg ostatních flavonoidů vyjádřených jako hesperidin).
- Dalšími složkami jsou:
Jádro tablety: sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), mikrokrytalická celulóza, želatina, magnesium-stearát, mastek.
Potahová vrstva tablety: bílý vosk, glycerol, hypromelosa 2910, makrogol 6000, natrium-lauryl-sulfát, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), magnesium-stearát.

Jak přípravek Mikronizované flavonoidy AGmed vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Mikronizované flavonoidy AGmed jsou potahované tablety. Jsou to růžovo-béžové oválné bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Balení obsahuje 30, 60, 90, 120 nebo 180 potahovaných tablet v PVC/Al blistru. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

AGmed s.r.o., Brandlova 1243/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika

Výrobce

HELP S.A., 10 Valaoritou street, Metamorphosis 144 52, Athens, Řecko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28. 5. 2024