

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU****krabička pro blistry****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Stacyl 100 mg enterosolventní tablety  
Acidum acetylsalicylicum

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jedna enterosolventní tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 100 mg.

**3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK****4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

10 enterosolventních tablet  
20 enterosolventních tablet  
28 enterosolventních tablet  
30 enterosolventních tablet  
50 enterosolventních tablet  
56 enterosolventních tablet  
60 enterosolventních tablet  
84 enterosolventních tablet  
90 enterosolventních tablet  
100 enterosolventních tablet  
120 enterosolventních tablet  
168 enterosolventních tablet  
266 enterosolventních tablet

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Perorální podání.  
Tablety se mají polykat vcelku. Nedrťte, nerozlamujte ani nerozkousávejte tablety.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ****8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Stada Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2 - 18  
61118 Bad Vilbel  
Německo

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg.č.: 16/612/12-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Doporučené dávkování:  
Prevence srdečních záchvatů, prevence srdečních a cévních problémů při angině pectoris, prevence tvorby krevních sraženin po chirurgických výkonech na srdci:  
Pokud lékař neurčil jinak, užívejte jednu tabletu (100 mg) denně.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

stacyl 100 mg

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička a štítek lahvičky

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Stacyl 100 mg enterosolventní tablety  
Acidum acetylsalicylicum

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna enterosolventní tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 100 mg.

### 3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

10 enterosolventních tablet  
30 enterosolventních tablet  
50 enterosolventních tablet  
100 enterosolventních tablet  
500 enterosolventních tablet

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.  
Tablety se mají polykat vcelku. Nedrťte, nerozlamujte ani nerozkousávejte tablety.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

### 8. POUŽITELNOST

EXP

### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.  
Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Stada Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2 - 18  
61118 Bad Vilbel  
Německo

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg.č.: 16/612/12-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Doporučené dávkování:  
Prevence srdečních záchvatů, prevence srdečních a cévních problémů při angině pectoris, prevence tvorby krevních sraženin po chirurgických výkonech na srdci.  
Pokud lékař neurčil jinak, užívejte jednu tabletu (100 mg) denně.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

stacyl 100 mg

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Stacyl 100 mg enterosolventní tablety  
Acidum acetylsalicylicum

**2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Stada Arzneimittel AG

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**5. JINÉ**