

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nurofen Junior pomeranč 100 mg žvýkací měkká tobolka
ibuprofenum

Pro děti od 20 kg tělesné hmotnosti (7 let) do 40 kg tělesné hmotnosti (12 let).

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje ibuprofenum 100 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje glukosu, sacharosu a sójový lecithin.

Podrobnější informace viz příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

2 žvýkací měkké tobolky
4 žvýkací měkké tobolky
6 žvýkacích měkkých tobolek
8 žvýkacích měkkých tobolek
10 žvýkacích měkkých tobolek
12 žvýkacích měkkých tobolek
14 žvýkacích měkkých tobolek
16 žvýkacích měkkých tobolek
18 žvýkacích měkkých tobolek
20 žvýkacích měkkých tobolek
22 žvýkacích měkkých tobolek
24 žvýkacích měkkých tobolek
26 žvýkacích měkkých tobolek
28 žvýkacích měkkých tobolek
30 žvýkacích měkkých tobolek
32 žvýkacích měkkých tobolek

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**8. POUŽITELNOST**

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**Držitel rozhodnutí o registraci:**

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č. ČR: 07/642/15-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Nurofen Junior pomeranč je určen pro děti od 7 do 12 let s tělesnou hmotností 20 - 40 kg, ke snížení horečky a k úlevě od mírné až středně silné bolesti, jako jsou bolest v krku, bolest zubů, bolest hlavy, bolest při zhmždění nebo podvrknutí a ke zmírnění příznaků chřipky a nachlazení.

Tobolky rozžvýkejte a pak polkněte. Není nutné ji zapíjet tekutinou.

Není určeno dětem mladším než 7 let nebo vážícím méně než 20 kg.

Hmotnost dítěte	Věk	Doporučená dávka
20 - 29 kg	7-9 let	2 tobolky, 3-krát během 24 hodin
30 - 40 kg	10-12 let	3 tobolky, 3-krát během 24 hodin

Jednotlivé dávky se mají podávat přibližně každých 6 až 8 hodin, s minimálním intervalem 6 hodin mezi jednotlivými dávkami.

VAROVÁNÍ: Nepřekračujte stanovené dávkování.

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě.

Pokud je nutné přípravek užívat déle než 3 dny, nebo pokud se příznaky zhorší, porad'te se s lékařem.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

nurofen junior pomeranč

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Blistr

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nurofen Junior pomeranč 100 mg žvýkací měkká tobolka
ibuprofenum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ