

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### KRABÍČKA

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Acetylcystein Dr.Max 600 mg šumivé tablety

Pro dospělé a dospívající od 14 let

acetylcysteinum

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna šumivá tableta obsahuje acetylcysteinum 600 mg.

#### 3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktózu, sodík a sorbitol. Další informace naleznete v příbalové informaci.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Šumivá tableta

Obal na tablety:

10 šumivých tablet

20 šumivých tablet

25 šumivých tablet

50 šumivých tablet

100 šumivých tablet

Strip:

10 šumivých tablet

20 šumivých tablet

100 šumivých tablet

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

#### 8. POUŽITELNOST

Obal na tablety: Doba použitelnosti po prvním otevření: 1 rok  
EXP

## 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Obal na tablety: Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu na tablety, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C.

## 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

## 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

### Držitel rozhodnutí o registraci:

Dr. Max Pharma s.r.o.  
Na Florenci 2116/15  
Nové Město  
110 00 Praha 1  
Česká republika

## 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 52/223/16-C

## 13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

## 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný i bez lékařského předpisu.

## 15. NÁVOD K POUŽITÍ

Acetylcystein Dr.Max je určen k léčbě akutních onemocnění dýchacích cest během běžného nachlazení spojeného s tvorbou viskózního hlenu a obtížným vykašláváním u dospělých a dospívajících od 14 let.

### Dávkování:

Dospělí a dospívající od 14 let: 1 šumivá tableta denně; dospívající mají užít polovinu tablety dvakrát denně.

Šumivá tableta má být rozpuštěna ve sklenici z poloviny naplněné vodou.

Roztok se užívá ihned po rozpuštění tablety, nejpozději 2 hodiny po něm.

Další informace naleznete v příbalové informaci.

## 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

acetylcystein dr.max

## 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

### OBAL NA TABLETY

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Acetylcystein Dr.Max 600 mg šumivé tablety

Pro dospělé a dospívající od 14 let

acetylcysteinum

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna šumivá tableta obsahuje acetylcysteinum 600 mg.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktózu, sodík a sorbitol. Další informace naleznete v příbalové informaci.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Šumivá tableta

10 šumivých tablet

20 šumivých tablet

25 šumivých tablet

50 šumivých tablet

100 šumivých tablet

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

#### 8. POUŽITELNOST

Po prvním otevření: 1 rok

EXP

#### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu na tablety, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Dr. Max Pharma s.r.o., Praha, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

52/223/16-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný i bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Acetylcystein Dr.Max je určen k léčbě akutních onemocnění dýchacích cest během běžného nachlazení spojeného s tvorbou viskózního hlenu a obtížným vykašláváním u dospělých a dospívajících od 14 let.

**Dávkování:**

Dospělí a dospívající od 14 let: 1 šumivá tableta denně; dospívající mají užít polovinu tablety dvakrát denně.

Šumivá tableta má být rozpuštěna ve sklenici z poloviny naplněné vodou.

Roztok se užívá ihned po rozpuštění tablety, nejpozději 2 hodiny po něm.

Další informace naleznete v příbalové informaci.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH**

**Stripy**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Acetylcystein Dr.Max 600 mg šumivé tablety

acetylcysteinum

**2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Dr. Max Pharma s.r.o.

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**5. JINÉ**