

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

(krabička)

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

COLDREX JUNIOR CITRON 300 mg/5 mg/20 mg prášek pro perorální roztok v sáčku  
paracetamol, phenylephrini hydrochloridum, acidum ascorbicum

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Paracetamol	300 mg
Phenylephrini hydrochloridum	5 mg
Acidum ascorbicum	20 mg

### 3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK

Jeden sáček obsahuje 56 mg sodíku, 1862 mg sacharózy a 3,325 mg glukózy.  
Další údaje viz příbalová informace.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

#### Prášek pro perorální roztok v sáčku

1 sáček  
3 sáčky  
5 sáčků  
10 sáčků  
12 sáčků

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.  
Coldrex Junior Citron je určený k perorálnímu podání ve formě teplého nápoje.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nepřekračujte uvedenou dávku. Užívání vyšších, než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Nepodávejte tento přípravek dítěti bez doporučení lékaře, pokud trpí jaterním onemocněním.

V případě předávkování musíte vyhledat lékařskou pomoc, i když se dítě cítí dobře.

Nepoužívejte současně jiné přípravky na chřipku a nachlazení nebo dekonjestanty.

Coldrex Junior Citron obsahuje paracetamol. Nepodávejte tento lék s žádným dalším lékem obsahujícím paracetamol.

## 8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

## 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25° C.

## 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

## 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

OMEGA PHARMA a.s., Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, Česká republika

Logo Perrigo

## 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

07/429/08-C

## 13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

## 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

## 15. NÁVOD K POUŽITÍ

### **COLDREX JUNIOR CITRON**

Pro děti od 6 do 12 let.

- Snižuje horečku
- Odstraňuje bolest hlavy
- Tlumí bolest svalů a kloubů
- Uvolňuje ucpaný nos
- Tlumí bolest v krku
- Tlumí bolesti vedlejších nosních dutin

+ vitamin C

### **Zmírňuje příznaky chřipky a nachlazení.**

COLDREX JUNIOR CITRON obsahuje kombinaci látek, která přináší úlevu od příznaků chřipky a nachlazení. Vysypte obsah sáčku do sklenice nebo do šálku a přelijte horkou vodou (přibližně

125 ml). Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. Přidejte studenou vodu a podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem.  
Teplý nápoj dejte dítěti vypít.

**Děti od 6 do 12 let s minimální tělesnou hmotností 20 kg:** 1 sáček každých 4-6 hodin podle potřeby. **Minimální interval 4 hodiny** mezi dávkami je třeba dodržovat. **Maximální denní dávka je 4 sáčky** v průběhu 24 hodin. Maximální délka léčby bez konzultace s lékařem je 3 dny. Pokud příznaky onemocnění přetrvávají, kontaktujte lékaře.

#### 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

COLDREX JUNIOR CITRON

#### 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

#### 18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**

(sáček)

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

COLDREX JUNIOR CITRON 300 mg/5 mg/20 mg prášek pro perorální roztok v sáčku

paracetamol, phenylephrini hydrochloridum, acidum ascorbicum

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Paracetamol	300 mg
Phenylephrini hydrochloridum	5 mg
Acidum ascorbicum	20 mg

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Obsahuje sodík, glukózu a sacharózu.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

3 g

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

K perorálnímu podání ve formě teplého nápoje.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ****7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ****8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ****10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ****11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

OMEGA PHARMA a.s., Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, Česká republika

Logo Perrigo

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

07/429/08-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

LOT

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

**Zmírňuje příznaky chřipky a nachlazení**

**Dávkování:** Děti 6 - 12 let s **minimální tělesnou hmotností 20 kg:** 1 sáček po 4-6 hodinách.

**Minimální interval 4 hodiny** mezi dávkami je třeba dodržovat. **Maximální dávka je 4 sáčky** v průběhu 24 hodin.

**Návod k použití:** Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. Doplněte studenou vodou a teplý nápoj dejte dítěti vypít.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**