

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

(krabička)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

COLDREX MAXGRIP CITRON 1000 mg/10 mg/40 mg prášek pro perorální roztok v sáčku
paracetamol, phenylephrini hydrochloridum, acidum ascorbicum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Paracetamol	1000 mg
Phenylephrini hydrochloridum	10 mg
Acidum ascorbicum	40 mg

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Jeden sáček obsahuje 116 mg sodíku, 6,65 mg glukózy a 3725 mg sacharózy.
Další údaje viz příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro perorální roztok v sáčku

1 sáček
3 sáčky
5 sáčků
6 sáčků
8 sáčků
10 sáčků
12 sáčků
14 sáčků

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI.
COLDREX MAXGRIP CITRON je určený k perorálnímu podání ve formě teplého nápoje.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

DŮLEŽITÉ:

Nepoužívejte současně jiné přípravky na chřipku a nachlazení nebo dekonjestanty.
COLDREX MAXGRIP CITRON obsahuje paracetamol. Nepodávejte tento lék s žádným dalším lékem obsahujícím paracetamol.

Nepřekračujte uvedenou dávku. Užívání vyšších než doporučených dávek, může vést k riziku závažného poškození jater. Neužívejte tento lék, pokud máte problémy s požíváním alkoholu nebo trpíte jaterním onemocněním.

V případě předávkování musíte vyhledat lékařskou pomoc, i když se cítíte dobře.

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

OMEGA PHARMA a.s., Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, Česká republika

Logo Perrigo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

07/166/02-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

COLDREX MAXGRIP CITRON

- Snižuje horečku
 - Odstraňuje bolest hlavy
 - Tlumí bolest v krku
 - Uvolňuje ucpaný nos
- + Vitamin C

Zmírňuje příznaky chřipky a nachlazení.

COLDREX MAXGRIP CITRON obsahuje kombinaci látek, která přináší úlevu od příznaků chřipky, nachlazení a jiných horečnatých onemocnění doprovázených ucpaným nosem.

Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. Roztok poté vypijte.

Dospělí a dospívající od 15 let s tělesnou hmotností nad 65 kg: 1 sáček každých 4-6 hodin podle potřeby. **Minimální interval 4 hodiny** mezi dávkami je třeba dodržovat. **Maximální denní dávka je 4 sáčky** v průběhu 24 hodin. Nepřekračujte doporučené dávkování.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

COLDREX MAXGRIP CITRON

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

(sáček)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

COLDREX MAXGRIP CITRON 1000 mg/10 mg/40 mg prášek pro perorální roztok v sáčku

paracetamol, phenylephrini hydrochloridum, acidum ascorbicum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Paracetamol	1000 mg
Phenylephrini hydrochloridum	10 mg
Acidum ascorbicum	40 mg

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Jeden sáček obsahuje 116 mg sodíku, 6,65 mg glukózy a 3725 mg sacharózy.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

6,4 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K perorálnímu podání ve formě teplého nápoje.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ****8. POUŽITELNOST**

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ****11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

OMEGA PHARMA a.s., Videaňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, Česká republika

Logo Perrigo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 07/166/02-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Zmírňuje příznaky chřipky a nachlazení.

Dávkování: Dospělí a dospívající od 15 let (nad 65 kg): 1 sáček po 4-6 hodinách, maximálně 4 sáčky za den.

Návod k použití: Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. Roztok poté vypijte.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM