

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Diclofenac Dr. Müller Pharma 10 mg/g gel  
diclofenacum natricum

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jeden gram gelu obsahuje diclofenacum natricum 10 mg.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Seznam pomocných látek: triacylglyceroly se středním řetězcem, propylenglykol (E 1520), karbomery, methylparaben (E 218), propylparaben (E 216), hydroxid sodný (E 524), hyetelosa, čištěná voda.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Gel

30 g  
50 g  
60 g  
100 g  
120 g  
150 g  
200 g

### 5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Kožní podání. Pouze k vnějšímu použití.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

### 8. POUŽITELNOST

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Po otevření spotřebujte do 12 měsíců.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Dr. Müller Pharma s.r.o.  
U Mostku 182, Pouchov, 503 41 Hradec Králové, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

29/412/16-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Diclofenac Dr. Müller Pharma se používá k úlevě od bolesti a zmírnění zánětu a otoku při poranění šlach, vazů, kloubů a svalů způsobených např. podvrtnutím, vymknutím a pohmožděním. Nanášejte gel lokálně na kůži postiženého místa 3 až 4krát denně a jemně vtírejte. Potřebné množství odpovídá velikosti třešně až vlašského ořechu dle rozsahu léčeného místa.  
**Tento léčivý přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 14 let.**

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

diclofenac dr. müller pharma 10 mg/g gel

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Tuba (30 g)

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Diclofenac Dr. Müller Pharma 10 mg/g gel  
diclofenacum natricum

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jeden gram gelu obsahuje diclofenacum natricum 10 mg.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Seznam pomocných látek: triacylglyceroly se středním řetězcem, propylenglykol (E 1520), karbomery, methylparaben (E 218), propylparaben (E 216), hydroxid sodný (E 524), hyetelosa, čištěná voda.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Gel

30 g

### 5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Kožní podání. Pouze k vnějšímu použití.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

### 8. POUŽITELNOST

EXP

### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Po otevření spotřebujte do 12 měsíců.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Dr. Müller Pharma s.r.o.  
U Mostku 182, Pouchov, 503 41 Hradec Králové, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

29/412/16-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Diclofenac Dr. Müller Pharma se používá k úlevě od bolesti a zmírnění zánětu a otoku při poranění šlach, vazů, kloubů a svalů způsobených např. podvrtnutím, vymknutím a pohmožděním. Nanášejte gel lokálně na kůži postiženého místa 3 až 4krát denně a jemně vtírejte. Potřebné množství odpovídá velikosti třešně až vlašského ořechu dle rozsahu léčeného místa.  
**Tento léčivý přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 14 let.**

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Tuba (50 g, 60 g, 100 g, 120 g, 150 g a 200 g)

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Diclofenac Dr. Müller Pharma 10 mg/g gel  
diclofenacum natricum

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jeden gram gelu obsahuje diclofenacum natricum 10 mg.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Seznam pomocných látek: triacylglyceroly se středním řetězcem, propylenglykol (E 1520), karbomery, methylparaben (E 218), propylparaben (E 216), hydroxid sodný (E 524), hyetelosa, čištěná voda.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Gel

50 g  
60 g  
100 g  
120 g  
150 g  
200 g

### 5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Kožní podání. Pouze k vnějšímu použití.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

### 8. POUŽITELNOST

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Po otevření spotřebujte do 12 měsíců.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ****11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Dr. Müller Pharma s.r.o.  
U Mostku 182, Pouchov, 503 41 Hradec Králové, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

29/412/16-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Diclofenac Dr. Müller Pharma se používá k úlevě od bolesti a zmírnění zánětu a otoku při poranění šlach, vazů, kloubů a svalů způsobených např. podvrtnutím, vymknutím a pohmožděním. Nanášejte gel lokálně na kůži postiženého místa 3 až 4krát denně a jemně vtírejte. Potřebné množství odpovídá velikosti třešně až vlašského ořechu dle rozsahu léčeného místa.  
**Tento léčivý přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 14 let.**

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU****17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD****18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**