

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TANTUM VERDE 1,5 mg/ml kloktadlo  
benzylamini hydrochloridum

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Složení  
Léčivá látka: jeden ml roztoku obsahuje benzylamini hydrochloridum 1,5 mg.

### 3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: přípravek obsahuje 9,6% obj. ethanolu, metylparaben a alergeny - viz příbalová informace.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Kloktadlo  
120 ml  
240 ml

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

### 8. POUŽITELNOST

EXP

### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

### 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Brno, Česká republika

### 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Návod k použití

Kloktadlo je určeno k léčbě příznaků zánětu spojených s bolestí v dutině ústní a krku. Může být použito při zánětech dásní, zánětech mandlí, aftách apod.

Dospělí, dospívající a děti od 6 let obvykle používají 1 - 2 polévkové lžice roztoku ke kloktání nebo k vyplachování úst.

Dětem od 4 let, které neumí kloktat, lze vytírat ústní dutinu tamponem namočeným v roztoku.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

tantum verde

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

<Neuplatňuje se.>

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

<Neuplatňuje se.>

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

**Etiketa**

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TANTUM VERDE 1,5 mg/ml kloktadlo  
benzylamini hydrochloridum

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Složení:

Léčivá látka: jeden ml roztoku obsahuje benzylamini hydrochloridum 1,5 mg.

### 3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: přípravek obsahuje 9,6% obj. ethanolu, metylparaben a alergeny - viz příbalová informace.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Kloktadlo  
120 ml  
240 ml

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

### 8. POUŽITELNOST

EXP

### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

### 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Brno, Česká republika

### 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 69/358/98-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ****15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Dospělí, dospívající a děti od 6 let obvykle používají 1 - 2 polévkové lžíce roztoku ke kloktání nebo k vyplachování úst.

Dětem od 4 let, které neumí kloktat, lze vytírat ústní dutinu tamponem namočeným v roztoku.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU****17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD****18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**