

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**

**KRABIČKA A ŠTÍTEK NA LAHVIČKU**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Dituzdin 6 mg/ml perorální roztok

levodropropizin

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jeden ml perorálního roztoku obsahuje 6 mg levodropropizinu.

**3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK**

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Perorální roztok

100 ml perorálního roztoku

120 ml perorálního roztoku

200 ml perorálního roztoku

**Krabička:**

Obsahuje odměrku

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**

EXP

Použitelnost po prvním otevření: 1 rok

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Teva B.V.  
Swensweg 5  
2031 GA Haarlem  
Nizozemsko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č.: 36/538/20-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Pro léčbu příznaků suchého neproduktivního kašle

Pro dospělé, dospívající a děti od 2 let

Pokud příznaky po 7 dnech používání přetrvávají nebo se zhoršují, přestaňte Dituzdin užívat a poradte se se svým lékařem.

**Štítek na lahvičku:**

Pokyny pro dávkování si přečtěte v příbalové informaci.

**Krabička:**

Dávkování:

Dospělí a dospívající od 12 let: 10 ml až 3krát denně.

Děti mezi 2 a 12 lety: Jednotlivá dávka viz tabulka. Lze podávat až 3krát denně.

Tělesná hmotnost	Jednotlivá dávka
do 12 kg	2 ml
12,5 - 18 kg	3 ml
18,5 - 24 kg	4 ml
24,5 - 30 kg	5 ml
30,5 - 36 kg	6 ml
36,5 - 42 kg	7 ml

Interval mezi dávkami musí být alespoň 6 hodin. Je doporučeno užívat mezi jídly.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

**Krabička:**

Dituzdin 6 mg/ml

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

neuplatňuje se

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

neuplatňuje se