

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA (pro blistry)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Panadol Duo 500 mg/200 mg potahované tablety
paracetamol/ibuprofen

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 500 mg paracetamolu a 200 mg ibuprofenu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

potahovaná tableta

10 potahovaných tablet
20 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Tento přípravek se má používat pouze při bolesti mírné až střední intenzity a pouze v případě, že zmírnění bolesti nebylo dostatečné po užití samotného paracetamolu nebo samotného ibuprofenu.

Obsahuje paracetamol.

Vyšší, než doporučené dávky mohou způsobit vážné poškození jater. Neužívejte Panadol Duo, pokud již užíváte jiné léky proti bolesti obsahující paracetamol, jakékoli jiné přípravky snižující bolest, včetně ibuprofenu, vysoké dávky kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních protizánětlivých léků.

Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud trpíte jaterním onemocněním nebo máte problémy s požíváním alkoholu.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Haleon Czech Republic s.r.o.,
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

logo Haleon

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 07/346/23-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Léčba bolesti, zánětu a snížení horečky

Panadol Duo se používá u dospělých ke krátkodobé léčbě mírné až středně silné bolesti, jako je migréna, bolest hlavy, bolest zad, menstruační bolest, bolest zubů, svalová bolest, k úlevě od příznaků nachlazení a chřipky, při bolesti v krku a při horečce.

Užívejte 1 tabletu (nebo 2 pro pacienty s tělesnou hmotností nad 60 kg, pokud je to nutné) až 3x denně s jídlem a zapíjejte ji vodou. Mezi jednotlivými dávkami dodržujte odstup alespoň 6 hodin a neužívejte více než 6 tablet během 24 hodin. Neužívejte déle než 3 dny.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

panadol duo

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH

BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Panadol Duo 500 mg/200 mg potahované tablety
paracetamol/ibuprofen

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

logo Haleon

3. POUŽITELNOST

EXP
bude vyraženo na obalu

4. ČÍSLO ŠARŽE

LOT
bude vyraženo na obalu

5. JINÉ