

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
(krabička)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Panadol Junior 250 mg čípky
paracetamol

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden čípek obsahuje 250 mg paracetamolu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje též ztužený tuk.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

čípky

10 čípků

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Rektální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Nepodávejte tento přípravek dítěti bez doporučení lékaře, pokud trpí jaterním onemocněním a/nebo užívá jakákoliv léčiva obsahující paracetamol.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

Haleon Czech Republic s.r.o.,

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

logo Haleon

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 07/605/96-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Snižuje horečku a tlumí bolest Pro děti od 15 kg

Panadol Junior čípky jsou výhodné především v případech, kdy dítě nechce nebo nemůže užívat léky ústy nebo když příznakem nemoci je zvracení.

Panadol Junior je určen ke snížení horečky provázející chřipku a nachlazení, stejně jako infekční onemocnění dětského věku (např. spalničky, zarděnky, plané neštovice, spálu, příušnice) a očkování. Panadol Junior čípky jsou též vhodné k tlumení bolesti provázející prořezávání zoubků, bolesti zubů, bolesti v krku při chřipce a nachlazení a bolesti hlavy.

Děti 15 – 30 kg: 1 čípek až 4x denně v časových odstupech 6 hodin.

Děti nad 30 kg: 1 až 2 čípky až 4x denně v časových odstupech 6 hodin.

Nepřekračujte doporučené dávkování.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

panadol junior čípky

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

(strip)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Panadol Junior 250 mg čípky
paracetamol

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Haleon Czech Republic s.r.o.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ

logo Haleon